

Состав

Кислота молочная, гликоген, пропиленгликоль, гидроксипропилметилцеллюлоза, натрия лактат, вода.

pH = 3,8.

Описание

Гель вагинальный «Лактагель» восстанавливает естественную среду во влагалище и устраняет симптомы - обильные выделения, дискомфорт и неприятный запах, применяется при бактериальном вагинозе.

Молочная кислота способствует снижению pH влагалища (то есть созданию более кислой среды), непригодной для развития патогенных бактерий и грибов.

Гликоген является питательной средой, необходимой для размножения лактобактерий.

Нормализует значения pH (pH=3,8-4,5) и создает соответствующие условия для размножения лактобактерий.

Показания

Лактагель рекомендован для использования при наличии специфических для вагиноза признаков: неприятного запаха и выделений, а также дискомфорта во влагалище, вызванного действием патогенной микрофлоры; при необходимости профилактики бактериального вагиноза; при прохождении курса антибиотиков или использовании противогрибковых препаратов, требующих поддержания нормальных для здоровой половой сферы показателей pH влагалища.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата Лактагель.

Следует избегать применения Лактагеля во время попыток зачатия, так как низкие значения pH влагалища негативно сказываются на активности сперматозоидов.

Лактагель не следует применять в качестве средства контрацепции.

Не использовать после истечения срока годности! Не использовать тюбик при нарушении его целостности.

Лактагель можно применять во время беременности, однако при подозрении на наличие вагинальной инфекции во время беременности рекомендуется обратиться к врачу.

Способ применения и дозы

Рекомендуется использовать Лактагель перед сном, так как некоторое количество геля может вытечь. Рекомендуется применять гигиенические прокладки для белья.

Устранение симптомов бактериального вагиноза – обильных выделений, неприятного запаха, влагалищного дискомфорта - применять 1 тюбик ежедневно в течение 7 дней.

Поддержание естественных значений pH влагалища и профилактика появления симптомов БВ - применять 1-2 тюбика в неделю.

Поддержание естественных значений pH влагалища во время курса антибиотиков и/или противогрибковых препаратов - во время курса антибиотикотерапии применять по 1 тюбику в сутки.

Устранение симптомов БВ после менструации - по окончании менструации применять 1 тюбик в сутки в течение 1-2 дней.

Условия хранения

Хранить при комнатной температуре, в недоступном для детей месте.

Упаковка

В тюбиках по 5 мл, 7 тюбиков в упаковке.

Производитель

Рольф Куллгрен АБ, а/я 123, 64622 Гнеста, Швеция.