

Состав

- Магния стеарат - 3.41 мг;
- лактозы моногидрат - 5.59 мг;
- крахмал картофельный (~41% от массы лиофилизата);
- лактозы моногидрат (~20.6% от массы лиофилизата);
- натрия глутамат (~4.5% от массы лиофилизата);
- натрия тиосульфат (~26.8% от массы лиофилизата);
- желатин.

Описание

Капсулы вагинальные прозрачные, желатиновые. Содержимое капсул - порошок светло-желтого с коричневатым оттенком цвета.

Lactobacillus casei - грамположительные палочкообразные анаэробные неспорообразующие бактерии. *Lactobacillus casei* - нормальная облигатная флора ротовой полости, кишечника, вульвы и влагалища человека. *Lactobacillus casei*, наряду с другими видами лактобактерий (в т.ч. *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus fermentum*, *Lactobacillus cellobiosum*), представлены в нормальной флоре вульвы и влагалища женщины.

Колонизация влагалища живыми палочками *Lactobacillus casei rhamnosus Doderleini* создает сходную с физиологической среду во влагалище. Штамм *Lactobacillus casei rhamnosus Doderleini* в составе препарата Лактожиналь обладает антагонистической активностью в отношении широкого спектра патогенных и условно-патогенных бактерий (включая *Staphylococcus spp.*, *Proteus spp.*, энтеропатогенную *Escherichia coli*), улучшает местные обменные процессы и способствует восстановлению естественного местного иммунитета.

При введении капсулы препарата Лактожиналь во влагалище желатиновая оболочка капсулы растворяется с высвобождением лиофилизированной культуры живых лактобактерий.

In vitro показано, что *Lactobacillus casei rhamnosus Doderleini* в течение нескольких часов после введения приводят к необходимому снижению pH, способствуя восстановлению естественной микрофлоры влагалища.

Дефицит лактобактерий является одним из важных факторов развития кандидозных вульвовагинитов. Лактобактерии являются физиологическими антагонистами дрожжеподобных грибов рода *Candida* за счет секреции антифунгальных веществ и конкуренции за рецепторы на эпителиоцитах

влагалища (подавляют прикрепление грибов рода *Candida* к эпителиоцитам влагалища, тормозят их рост и размножение).

Результаты клинического исследования показали эффективность препарата Лактожиналь в восстановлении нормальной микрофлоры влагалища и профилактике рецидивирующего кандидозного вульвовагинита при его применении после завершения терапии противогрибковыми препаратами.

Показания

Таблетки Лактожиналь ЛП могут использоваться:

- после приема антибактериальных препаратов;
- повторяющихся курсов противогрибковой инфекции.

Противопоказания

1. Вульвовагинальный кандидоз ("молочница").
2. Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
3. Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Особенности применения

После введения капсула растворяется, не оставляя пятен на белье или запаха. Препарат предназначен для применения у женщин старше 18 лет.

Способ применения и дозы

Для облегчения ввода, смочите таблетку в небольшом количестве воды. Введите глубоко во влагалище перед тем, как ложиться спать.

1 таблетка каждые 4 дня:

- для восстановления микрофлоры влагалища: 2 таблетки;
- для предотвращения рецидива: 6 таблеток.

Побочные реакции

Зуд, жжение, покраснение в области половых органов, усиление слизистых выделений из влагалища.