

Состав

действующее вещество: Ихтаммол (ихтиол) 200 мг (в пересчете на аммиак—5,13 мг);

вспомогательные вещества: вода очищенная, эмульгатор Т-2, жир твердый (Витепсол (марки Н 15, W 35), Суппосир (марки NA 15, NAS 50)).

Лекарственная форма

Суппозитории торпедообразной формы от темно-коричневого до черно-коричневого цвета с характерным запахом. Допускается появление налета на поверхности суппозитория и наличие на срезе воздушного стержня и воронкообразного углубления.

Фармакотерапевтическая группа

Противовоспалительное средство для местного применения.

Фармакодинамика

Противовоспалительное средство, оказывает местнообезболивающее, антисептическое действие. Противовоспалительное действие связано с ингибированием высвобождения медиаторов воспаления. При ректальном введении препарат Ихтиол оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку прямой кишки, вследствие чего рефлекторно усиливается кровообращение в органах малого таза, улучшается обмен веществ, что способствует устранению воспаления в предстательной железе у мужчин, яичниках, маточных трубах, матке у женщин.

Фармакокинетика

Не описана.

Показания

Сальпингоофорит, эндометрит, простатит – в составе комплексной терапии.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, детский возраст (до 18 лет).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Несовместим в растворах с йодистыми солями, алкалоидами, солями тяжелых металлов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Применение в период беременности или кормления грудью

При беременности и в период грудного вскармливания препарат применяют с осторожностью. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Ректально, по 1 суппозиторию 1-2 раза в день, после очистительной клизмы или самопроизвольного очищения кишечника. Длительность курса лечения определяется лечащим врачом.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Дети

Противопоказано.

Передозировка

О случаях передозировки препарата не сообщалось.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции, ощущение жжения в области заднего прохода. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции,

или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Срок годности

2 года.

Не применять после истечения срока годности.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 20 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 5 суппозиториев в контурную ячейковую упаковку из двухслойной пленки алюминийполиэтилен.

По 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата помещают в пачку из картона.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

АО «Нижфарм», Россия.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

603950, г. Нижний Новгород, ул. Салганская, д. 7.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).