

Состав

действующие вещества: 100 г сиропа содержат: жидкого экстракта подорожника остролистного (*Extractum Plantaginis liquidum*) (1:2-2,5) 3 г, жидкого экстракта тимьяна (тимьяна) (*Extractum Thymi liquidum*) (1:2-2,5) 15 г;

вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат (Е 218), пропилпарагидроксибензоат (Е 216), сироп инвертированного сахара (глюкозы моногидрат, фруктоза, сахароза, вода очищенная).

Лекарственная форма

Сироп.

Основные физико-химические свойства: темнокоричневая жидкость от прозрачной до мутной.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Код АТХ R05C A10.

Фармакодинамика

Вещества, содержащиеся в жидких экстрактах подорожника, и чабреца (тимьяна), в частности эфирные масла, как отхаркивающие средства влияют на свойства, образование и транспортировку бронхиального секрета.

Осуществляется как косвенное рефлекторное влияние через слизистую желудка, так и прямое влияние эфирных масел на бронхиальные железы, что усиливает их активность. Это способствует увеличению, разжижению и растворению бронхиального секрета, а также усилению транспортировки секрета через реснитчатый эпителий. Это особенно важно на более поздних стадиях острого бронхита и при хроническом бронхите, когда происходит усиленное выделение вязкой слизи подслизистыми железами. Кроме того, эфирные масла благодаря своей поверхностной активности уменьшают связующую способность высоковязкой слизи на трахеобронхиальной слизистой.

Тимьян характеризуется выраженным противомикробным потенциалом тимола и карвакрола. Растительные слизистые вещества подорожника способствуют защите поврежденной слизистой бронхов от дальнейшего раздражения.

Фармакокинетика

Не исследовалась.

Показания

Симптоматическое лечение воспалительных заболеваний дыхательных путей.
Отхаркивающее средство для симптоматического лечения продуктивного кашля.
Поддерживающее средство при коклюше.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; непереносимость фруктозы; повышенная чувствительность к алкил-4-гидроксibenзоатам.
Повышенная чувствительность к растениям семейства губоцветных (Lamiaceae), сельдерею и пиле березы (возможна перекрестная реакция).

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, включая рефлюкс-эзофагит, гастрит с повышенной кислотностью желудочного сока, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, тяжелые заболевания печени или почек.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не применять одновременно с противокашлевыми препаратами и лекарственными средствами, уменьшающими выделение мокроты. Из-за содержания этанола (6,5 об.%) существует возможность ухудшения или усиления действия других лекарственных средств.

Особенности применения

Перед применением необходимо взболтать сироп во флаконе. Наличие в препарате составных частей растительного происхождения может привести к помутнению сиропа, однако терапевтическая эффективность препарата от этого не уменьшается.

В препарате Эвкабал сироп содержится 6,5 об. % этанола, создающего риск для больных эпилепсией, хроническим алкоголизмом, заболеваниями печени, органическими заболеваниями мозга.

Не применять пациентам с непереносимостью фруктозы, нарушением всасывания глюкозы-галактозы или сахарозы-изомальтозы. Из-за содержания сахаров может быть вредным для зубов (кариес).

При первых признаках реакций, вызванных чрезмерной чувствительностью, не следует продолжать прием препарата.

С осторожностью применять пациентам, больным сахарным диабетом.

Указание для больных сахарным диабетом

Эвкабал® сироп содержит глюкозу, фруктозу и сахарозу с общим содержанием сахара в пересчете на сахарозу 0,6 г/мл. Таким образом, в 1 чайной ложке (5 мл) содержится 3 г сахарозы или 0,25 хлебных единиц, а в 1 десертной ложке (10 мл) – 6 г сахарозы или 0,5 хлебных единиц.

Если во время лечения препаратом ухудшается симптоматика и/или появляются одышка, повышение температуры тела, гнойная мокрота, необходимо проконсультироваться с врачом.

Если в течение недели симптоматика сохраняется, нужно проконсультироваться с врачом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет на применение в рекомендованных дозах, но следует учитывать, что в состав вспомогательных веществ входит этанол 6,5 об.%.

Применение в период беременности или кормления грудью

Из-за отсутствия достаточных данных не рекомендуется применять препарат в эти периоды.

Способ применения и дозы

Детям от 1 до 5 лет назначать по 1 чайной ложке (5 мл) 3-5 раз в сутки. Детям в возрасте от 6 до 12 лет – по 1 десертной ложке (10 мл) 3-5 раз в сутки. Детям от 12 лет и взрослым назначать по 1-2 десертные ложки (10-20 мл) 3-5 раз в сутки.

Продолжительность лечения определяет врач индивидуально, что зависит от течения заболевания и состояния пациента.

Дети

Не назначать детям до 1 года.

Передозировка

Симптомы. При передозировке может появиться тошнота, сопровождающаяся покашливанием.

Лечение. Отмена препарата. Терапия симптоматическая.

Побочные реакции

Возможны желудочно-кишечные расстройства (включая тошноту, рвоту, диарею), реакции гиперчувствительности, включая кожную сыпь, крапивницу, зуд, ангионевротический отек, одышку, экзантему.

Срок годности

2 года.

Не применять препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке. После открытия флакона препарат пригоден для применения в течение 12 недель.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.

Упаковка

По 100 мл сиропа в стеклянном флаконе. По 1 флакону в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Фарма Вернигероде ГмбХ.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Дорнбергсвег, 35, 38855 Вернигероде, Германия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).