

Состав

действующее вещество: 1 таблетка содержит бета-аланина 400 мг;

вспомогательные вещества: магния стеарат, глицерина пальмитостеарат, кремния диоксид водный, крахмал пшеничный.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: таблетки белого цвета со скошенными краями.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые в гинекологии. Код АТХ G02C X.

Фармакодинамика

Бета-аланин - чистая аминокислота, с химической структурой, полностью отличается от структуры гормона. Препарат противодействует резкому высвобождению гистамина. Однако препарат не имеет антигистаминного активности (отсутствие блокировки H1-рецепторов).

Бета-аланин имеет прямое влияние вийнятково на кожную периферическую вазодилатацию, что приводит вегетативные приливы, ощущение тепла, жара, головная боль.

На физиологическом уровне вазомоторные приливы вызваны вовлечением терморегуляторных центров в гипоталамусе, что приводит к периферической кожной вазодилатации. Это является результатом механизма, вступает в действие при нарушении баланса церебральных нейротрансмиттеров, который наступает после прекращения секреции гормонов яичниками. Препарат способствует насыщению периферических рецепторов нейротрансмиттеров,

участвующих в процессе.

Показания

Абьюфен показан для лечения приливов, связанных с менопаузой.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Повышенная чувствительность или непереносимость глютена, поскольку препарат содержит крахмал пшеничный.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не взаимодействует с гормонами. Возможно применение в комплексе с нейролептиками или слабыми барбитуратами.

Особенности применения

Препарат рекомендуется применять при предменопаузы, менопаузах различной этиологии и постменопаузе, перед заместительной гормонотерапии и в комбинации с заместительной гормонотерапии. В отличие от других препаратов бета-аланин не влечет к задержке жидкости и увеличение массы тела. Признаки привыкания к препарату не обнаружены. Отсутствует седативное действие. В случае побочных реакций со стороны кожи (сыпь, зуд) лечение следует прекратить.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Препарат не применять в период беременности и кормления грудью.

Способ применения и дозы

Абьюфен применять внутрь. Принимать от 1 до 2 таблеток в сутки (перед основным приемом пищи). Эту дозу можно увеличить до 3 таблеток в сутки.

Минимальный курс лечения - от 5 до 10 дней (до прекращения приливов).

При возобновлении приливов лечение может осуществляться в течение всего периода клинических вазомоторных расстройств, без ограничения времени применения.

Дети

Препарат не применять детям.

Передозировка

Случаев передозировки не отмечено.

Побочные реакции

Возможны единичные случаи таких побочных реакций: парестезии, обычно в конечностях; аллергические реакции, включая сыпь на коже и слизистых оболочках, покраснение кожи, зуд, крапивница; синяки.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 ° С.

Упаковка

По 15 таблеток в блистере, по 2 блистера в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Лаборатории Бушара Рекордати, Франция.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Парк Мекатроник, 03410, Сент Виктор, Франция.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).