

Опис

Детраклін Гель

- Миттєве охолодження, яке полегшує анальний дискомфорт (подрознення, свербіж, печіння, підвищену чутливість)
- Попередження анального дискомфорту
- Попередження розвитку геморою та тріщин
- Сприяє процесу природного загоювання
- Гігієнічність та зручність застосування

Показання до використання

Детраклін застосовується для полегшення та попередження анального дискомфорту, в тому числі симптомів геморою: подразнення, свербіжу, печіння і підвищеної чутливості.

Геморой та інші види анального дискомфорту часто зустрічаються під час вагітності і після пологів.

Властивості

Детраклін містить 37 г гелю на основі запатентованого біореактивного 2QR-комплексу, отриманого з рослини алое Барбадоське. Цей продукт не містить парфумованих віддушок та інгредієнтів тваринного походження.

Детраклін ефективний у полегшенні та попередженні анального дискомфорту, такого як свербіж, подразнення, печіння та підвищена чутливість. Біоактивний гель сприяє швидкому полегшенню при геморої, тріщинах та анальному дискомфорту. Біологічно активний інгредієнт, 2QR-комплекс, нейтралізує шкідливі мікроорганізми, сприяє процесу природного загоєння та відновленню тканин. Детраклін також забезпечує змащення для полегшення акту випорожнення.

Склад

Вода, гель алое Барбадоського, кросполімер галактоарабінану поліглюкуронової кислоти*, ПЕГ-8, ксантанова камедь, бетаїн, лаурет-9, феноксіетанол, етилгексилгліцерин, натрію гідроксид, калію фосфат. *2QR-комплекс / Aqua, Aloe Barbadensis Gel, Galactoarabanan Poly-gIucuronic Acid Crosspolymer*, PEG-8, Xanthan Gum, Betaine, Laureth-9, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, Potassium phosphate. * 2QR

Особливості застосування

Детраклін не містить токсичних хімічних речовин. При застосуванні Детракліну не повідомлялось про будь-які небажані ефекти.

Будь ласка, спершу проконсультуйтеся з лікарем якщо: протягом тривалого часу Вас непокоїть гемороїдальна хвороба або спостерігається надмірна кровотеча.

Застосування інших препаратів: про взаємодію з іншими препаратами не повідомлялось.

Спосіб застосування та дози

Для полегшення анального дискомфорту (подразнення, свербіжу, печіння, підвищеної чутливості): наносити всередину та навколо ураженої ділянки принаймні двічі на добу у достатній кількості протягом двох тижнів або коли необхідно полегшити стан. Більш часте застосування покращує ефект.

Для попередження (внутрішнього та зовнішнього) геморою і тріщин: наносити всередину та навколо анального отвору до та після кожного акту випорожнення. Нанесіть невелику кількість гелю на палець або використайте аплікатор. Нанесіть всередину та навколо анального каналу, коли необхідно полегшити стан. Щільно закрийте кришку туби після застосування для запобігання висихання гелю.

Тривалість використання Детракліну не повинна перевищувати 30 днів протягом одного періоду застосування.

Не слід застосовувати цей продукт у разі підвищеної чутливості до одного або декількох його інгредієнтів.

Умови зберігання

Детраклін слід застосовувати при кімнатній температурі. Зберігати тубу щільно закритою кришкою при температурі від 5 до 25 °C в захищеному від прямих сонячних променів місці. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не використовуйте цей продукт після закінчення терміну його придатності, вказаного у верхній частині туби та на упаковці.

Упаковка

- Туба, що містить 37 г гелю Детраклін

- Інструкція для застосування
- Аплікатор

Виробник

ЮМедікал Б.В. (комерційна назва - Трімб Хелскеа) 201 Барбара
Штроззілаан, 1083HN Амстердам Нідерланди

YouMedical B.V. (also trading as Trimb Healthcare) Barbara Strozzilaan 201,
1083HN Amsterdam The Netherlands

Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «Серв'є Україна» вул. Набережно-Хрещатицька, 41, 04070, м. Київ,
Україна

Всі запити стосовно цього продукту слід надсилати Уповноваженому
представнику в Україні.