

Состав

действующее вещество: dexpanthenol;

1 г крема содержит декспантенола 50 мг;

вспомогательные вещества: DL-пантолактон, феноксиэтанол, амфизол К, спирт цетиловый, спирт стеариловый, ланолин, изопропилмиристат, пропиленгликоль, вода очищенная.

Лекарственная форма

Крем.

Основные физико-химические свойства: гомогенный непрозрачный крем белого или белого с желтоватым оттенком цвета, со слабым запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для лечения ран и язвенных поражений. Препараты, способствующие заживлению (рубцеванию) ран. Декспантенол.

Код АТХ D03A X03.

Фармакодинамика

Декспантенол, действующее вещество крема Бепантен ®, в клетках быстро превращается в пантотеновую кислоту и действует как витамин. Декспантенол легче, чем пантотеновая кислота, абсорбируется после местного применения.

Пантотеновая кислота является компонентом эссенциального коэнзима А (CoA). Ацетилкоэнзим А (acetyl-CoA) играет центральную роль в метаболических процессах в клетках. Таким образом, пантотеновая кислота необходима для восстановления и регенерации поврежденных кожи и слизистых оболочек.

Фармакокинетика

Декспантенол быстро абсорбируется кожей. После чего сразу превращается в пантотеновую кислоту и добавляется к внутреннему депо этого витамина.

В крови пантотеновая кислота связывается с белками плазмы крови (преимущественно с β -глобулинами и альбумином). У здоровых взрослых

концентрация составляет примерно 500-1000 мкг/л и 100 мкг/л в крови и сыворотке крови соответственно.

Пантотеновая кислота не метаболизируется в организме и выводится в неизмененном виде. После приема внутрь 60-70% дозы препарата выводится с мочой, остальное - с калом. У взрослых выделяется с мочой 2-7 мг пантотеновой кислоты в сутки, у детей - 2-3 мг.

Показания

Бепантен ®, крем, применять в следующих случаях:

- профилактическая обработки сухой, покрасневшей кожи или кожи с трещинами;
- ускорение заживления и эпителизации кожи при микроповреждениях (нетяжкие ожоги и ссадины) при раздражениях кожи (например, вследствие радиотерапии, фототерапии или облучения ультрафиолетовыми лучами) пеленочного дерматита;
- при хронических язвах кожи и пролежней; анальных трещинах; эрозии шейки матки и после пересадки кожи;
- обработка кожи пациентов во время и после местного применения кортикостероидов;
- профилактический уход за молочными железами у женщин, кормящих грудью, и для лечения раздражений и трещин сосков.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к декспантенолу или другим компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Случаи взаимодействия с другими лекарственными средствами неизвестны.

Особенности применения

При применении препарата следует избегать контакта с глазами.

Цетиловый спирт, стеариловый спирт, ланолин могут вызывать местные кожные реакции (например контактный дерматит). Пропиленгликоль может вызвать раздражение кожи.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Нет никаких оснований считать, что применение препарата в период беременности и кормления грудью является рискованным. В течение беременности препарат следует применять по назначению врача.

При применении для лечения трещин сосков в течение кормления грудью препарат следует смыть перед кормлением.

Способ применения и дозы

Ускорение заживления и эпителизации, регулярный уход за кожей: применять Бепантен ®, крем, один или несколько раз в сутки в случае необходимости.

Уход за молочными железами у женщин, кормящих грудью: наносить крем на соски после каждого кормления грудью.

Лечение дефектов слизистой оболочки шейки матки: применять крем один или несколько раз в сутки под наблюдением врача.

Уход за младенцами: применять Бепантен ®, крем, после каждой смены пеленок (подгузника).

Бепантен ®, крем, быстро проникает в кожу, поэтому пригоден для ухода за мокнущими ранами, незащищенными поверхностями кожи (лицо) и волосистыми участками кожи. Он легко распределяется по поверхности, поэтому пригоден для лечения болезненных солнечных и других нетяжелых ожогов.

Дети

Препарат применять детям разных возрастных групп, включая младенцев.

Передозировка

Даже ненадлежащее применение большего количества лекарственного средства Бепантен ®, крем, не приводит к токсическим побочным реакциям.

Побочные реакции

Со стороны иммунной системы, а также кожи и подкожных тканей. В редких случаях (<1/10 000) сообщалось о аллергических реакциях и аллергических реакциях со стороны кожи: контактный дерматит, аллергический дерматит, зуд, эритема, экзема, сыпь, крапивница, раздражение кожи и пузырьки.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 ° C. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 30 г тубе, по 1 тубе в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ГП Грензах ПРОДУКТИОНС ГмбХ/GP Grenzach Produktions GmbH

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Эмил-Барелли-Штрассе 7, 79639 Грензах-Вилена, Германия/Emil-Barell-Strasse 7, 79639 Grenzach-Wyhlen, Germany.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).