

Состав

действующее вещество: 1 флакон содержит настойки цветков календулы (Calendulae flores) (1:10), (экстрагент - этанол 70%) - 40 мл.

Лекарственная форма

Настойка.

Основные физико-химические свойства: жидкость желто-коричневого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты, способствующие заживлению.

Код АТХ D03A X.

Фармакодинамика

Биологически активные вещества, содержащиеся в цветках и цветочных корзинках календулы (флавоноидные и каротиноидные гликозиды, сапонины, дубильные вещества, эфирное масло, органические кислоты), оказывают противомикробное, противовоспалительное и умеренное желчегонное действие.

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания

Местный антисептическое средство при инфицированных (гнойных) ранах, порезах, ожогах кожи и при воспалении слизистых оболочек полости рта, десен (стоматит, гингивит), глотки, миндалин (фарингит, ангина), внутрь - как желчегонное средство при дискинезиях желчевыводящих путей, холангит, холециститах (в составе комплексной терапии).

Противопоказания

Календулы настойка противопоказана при индивидуальной непереносимости любого из компонентов препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Календулы настойка усиливает действие других противовоспалительных и желчегонных средств (в частности препаратов на основе ромашки и тысячелистника). При одновременном применении с любыми другими лекарственными средствами следует сообщить врачу.

Особенности применения

Препарат содержит спирт! Не рекомендуется применение препарата в течение длительного времени.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Следует воздерживаться от управления транспортом или работы с механизмами в период применения внутрь.

Применение в период беременности или кормления грудью

Поскольку в состав препарата входит этанол, настойку не рекомендуется принимать внутрь в период беременности или кормления грудью.

Способ применения и дозы

Календулы настойку принимать внутрь за 15-30 минут до еды, разводя в небольшом количестве теплой кипяченой воды. Взрослым рекомендуется применять по 10-20 капель настойки 3-4 раза в день в течение 1 месяца. Детям старше 12 лет - из расчета 1 капля настойки на 1 год жизни 3-4 раза в сутки.

Для полоскания полости рта 1 чайную ложку календулы настойки разводят в стакане теплой кипяченой воды.

Способ применения препарата для местных аппликаций зависит от характера поражения кожи и определяется врачом.

Продолжительность применения препарата зависит от достигнутого терапевтического эффекта и переносимости препарата.

Пациент должен проконсультироваться с врачом, если симптомы заболевания не исчезли во время применения лекарственного средства или наблюдаются побочные реакции, не указанные в инструкции по медицинскому применению

лекарственного средства.

Дети

Не применять детям до 12 лет из-за содержания этанола.

Передозировка

Сообщение отсутствуют.

Побочные реакции

Со стороны иммунной системы. Препарат, как правило, переносится хорошо, однако у некоторых больных при индивидуальной повышенной чувствительности возможно развитие аллергических реакций, включая покраснение кожи, сыпь, зуд, ангионевротический отек.

Со стороны органов пищеварения. При приеме внутрь возможно ощущение горечи во рту, жжение в эпигастральной области, боли в животе.

В случае возникновения любых нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу!

Срок годности

4 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 40 мл в флаконе.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «ФИТОФАРМ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 84500, Донецкая обл., г. Бахмут, ул. Сибирцева, 2.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).