

Состав

действующие вещества: 1 мл препарата содержит глицерина в пересчете на 85% 0,25 г, аммиака раствора 10% 0,25 мл, этанола 96% 0,25 мл;

вспомогательные вещества: вода очищенная.

Лекарственная форма

Жидкость накожная.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость с запахом аммиака.

Фармакотерапевтическая группа

Средства со смягчающим и защитным действием. Код АТХ D02A X.

Фармакодинамика

Лекарственное средство обладает противовоспалительным и антисептическим действием, улучшает эластичность кожи.

Фармакокинетика

Не изучали.

Показания

Применяют при сухости кожи рук и трещинах.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, язвенные, гнойничковые, травматические повреждения кожи рук.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Взаимодействие неизвестно.

Особенности применения

Не нарушать правила применения лекарственного средства. Избегать попадания в глаза и на слизистые оболочки. Не применять при трещинах сосков молочной железы.

При случайном попадании Дермасана на слизистые оболочки глаза - промывать водой несколько раз (в течение 15 минут с перерывом 10 минут) или 3% раствором борной кислоты. Если лекарственное средство попал в нос и глотку, применяют 0,5% раствор лимонной кислоты или натуральные соки. В случае случайного приема внутрь - пить воду, фруктовый сок, молоко, лучше - 0,5% раствор лимонной кислоты или 1% раствор уксусной кислоты до полной нейтрализации содержимого желудка.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Влияния на способность управлять автотранспортом и работать с механизмами не выявлено.

Применение в период беременности или кормления грудью

Не рекомендуется применение лекарственного средства в период беременности или кормления грудью.

Способ применения и дозы

Применяют наружно для взрослых. Препарат втирать в чисто вымытую с мылом и хорошо высушенную полотенцем кожу рук 2 - 3 раза в день.

Срок применения обусловлен достигнутым эффектом.

Дети

Опыт применения препарата у детей отсутствует.

Передозировка

Не обнаружено.

Побочные реакции

Раздражение, дерматиты, экзема в месте аппликации, аллергические реакции.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 мл во флаконах.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «ФИТОФАРМ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 84500, Донецкая обл., г. Бахмут, ул. Сибирцева, 2.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).