

Состав

действующее вещество: dexpanthenol;

1 г мази содержит декспантенола 50 мг;

вспомогательные вещества: спирт цетиловый, спирт стеариловый, воск белый, ланолин, парафин белый мягкий, масло миндальное рафинированное, масло минеральное, протегин Х (масло минеральное, парафин желтый мягкий, озокерит, глицерин олеат, ланолиновый спирт), вода очищенная .

Лекарственная форма

Мазь.

Основные физико-химические свойства: гомогенная мазь белого с кремовым оттенком цвета, со специфическим запахом ланолина.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для лечения ран и язвенных поражений. Препараты, способствующие заживлению (рубцеванию) ран. Декспантенол. Код АТХ D03A X03.

Фармакодинамика

Декспантенол, действующее вещество Бепантен крема, в клетках быстро превращается в пантотеновую кислоту и действует как витамин. Декспантенол легче, чем пантотеновая кислота, абсорбируется после местного применения.

Пантотеновая кислота является компонентом эссенциального коэнзима А (CoA). В этой форме ацетилкоэнзима А, CoA играет центральную роль в метаболизме каждой клетки. Пантотеновая кислота является таким образом необходимым для восстановления и регенерации поврежденных кожи и слизистых оболочек.

Фармакокинетика

Декспантенол быстро абсорбируется кожей. После чего сразу превращается в пантотеновую кислоту и добавляется к внутреннему депо этого витамина.

В крови пантотеновая кислота связывается с белками плазмы крови (преимущественно с β -глобулинами и альбумином). У здоровых взрослых концентрация составляет примерно 500-1000 мкг / л и 100 мкг / л в крови и сыворотке крови соответственно.

Пантотеновая кислота не метаболизируется в организме и выводится в неизмененном виде. После приема внутрь 60-70% дозы препарата выводится с мочой, остальное - с калом. У взрослых выделяется с мочой 2-7 мг пантотеновой кислоты в сутки, у детей - 2-3 мг.

Показания

Бепантен ®, крем, применять в следующих случаях:

- профилактическое обработки сухой, покрасневшей кожи или кожи с трещинами;
- ускорение заживления и эпителизации кожи при микроразрывах (незначительные ожоги и ссадины) при раздражениях кожи (например, вследствие радиотерапии, фототерапии или облучения ультрафиолетовыми лучами) пеленочного дерматита; при хронических язвах кожи и пролежнях; анальных трещинах; эрозии шейки матки и после пересадки кожи;
- обработка кожи пациентов во время и после местного применения кортикостероидов;
- профилактический уход за молочными железами у женщин, кормящих грудью, и для лечения раздражений и трещин сосков.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к декспантенолу или другим компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Случаи взаимодействия с другими лекарственными средствами неизвестны.

Особенности применения

При применении препарата следует избегать контакта с глазами.

Цетиловый спирт, стеариловый спирт, ланолин могут вызывать местные кожные реакции (например контактный дерматит).

Применение мази Бепантен® для заживления и лечения ран в области половых органов или заднего прохода при одновременном использовании презервативов с латекса приводит к уменьшению прочности и надежности презервативов, поскольку Бепантен® мазь, содержит в качестве вспомогательного вещества парафин белый мягкий.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Нет никаких оснований считать, что применение препарата в период беременности и кормления грудью является рискованным. В течение беременности препарат следует применять по назначению врача.

При применении для лечения трещин сосков в течение кормления грудью препарат следует смыть перед кормлением.

Способ применения и дозы

Лечение поверхностных ран любого происхождения и профилактика потрескавшейся, сухой или шершавой кожи: применять Бепантен® мазь, 1 или несколько раз в сутки в случае необходимости.

Уход за молочными железами у женщин, кормящих грудью: наносить мазь на соски после каждого кормления грудью.

Лечение дефектов слизистой оболочки шейки матки применять мазь 1 или несколько раз в сутки под наблюдением врача.

Уход за младенцами: применять Бепантен® мазь, после каждой смены пеленок (подгузника).

Бепантен® мазь, действующим веществом которого является декспантенол, имеет основу, содержит большое количество жира. На мокнущие раны, незащищенные поверхности кожи (лицо) и волосистые участки лучше наносить Бепантен®, крем быстро проникает в кожу.

Дети

Препарат применять детям разных возрастных групп, включая младенцев.

Передозировка

Действующее вещество мази Бепантен ®, декспантенол, нетоксичное.

Гипервитаминоз не описан.

Побочные реакции

Со стороны иммунной системы, а также кожи и подкожных тканей.

Сообщалось об аллергических реакциях и *аллергических реакциях со стороны кожи*: контактный дерматит, аллергический дерматит, зуд, эритема, экзема, сыпь, крапивница, раздражение кожи и пузырьки.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить при температуре ниже 25 ° C. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 100 г в тубе, по 1 тубе в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ГП Грензах Продуктионс ГмбХ / GP Grenzach Produktions GmbH.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Эмил-Барелли-Штрассе 7, 79639 Грензах-Вилена, Германия / Emil-Barell-Strasse 7, 79639 Grenzach-Wyhlen, Germany.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).