

Состав

действующее вещество: хлорамфеникол;

1 мл препарата содержит 2,5 мг хлорамфеникола;

вспомогательные вещества: этанол 70%.

Лекарственная форма

Раствор наружный, спиртовой 0,25%.

Основные физико-химические свойства: прозрачная, бесцветная жидкость со спиртовым запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Антибиотики для местного применения. Код АТХ D06A X02.

Фармакодинамика

При местном применении препарат оказывает антимикробное действие в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий. Влияет на возбудителей, устойчивых к антибиотикам группы пенициллина, стрептомицина, сульфаниламидов. Устойчивость к самому хлорамфениколу развивается медленно. Препарат оказывает бактериостатическое действие; будучи жирорастворимым, хлорамфеникол проникает через клеточную мембрану бактерий и обратимо связывается с субъединицей 50S бактериальных рибосом, в которых задерживается перемещение аминокислот к пептидным цепям, растут, в результате чего нарушается формирование пептидных связей и дальнейший синтез белка.

Фармакокинетика

При наружном применении препарат плохо проникает через неповрежденную кожу и слизистые оболочки, поэтому резорбтивное действие слабое.

Бактериостатическое действие при нанесении на поверхность зависит от

размера пораженного участка, количества навоза, механических препятствий. В среднем противомикробный эффект сохраняется в течение 6-12 часов, после чего нанесения препарата следует повторить.

Показания

Применяют наружно при ожогах, порезах, трещинах кожи, отитах и воспалительных заболеваниях, осложненных гнойной патологией.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, дефицит фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, острая интермиттирующая порфирия, заболевания кожи (псориаз, экзема, грибковые поражения).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Одновременное применение с препаратами, угнетающими кроветворение (сульфаниламидами, цитостатиками, производными пиразолина), нежелательно.

Особенности применения

При тяжелых инфекциях кожи или ушей, левомецетин внешне следует применять после консультации с врачом в комплексной терапии вместе с антибактериальными средствами системного действия.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Нет свидетельств, что препарат может отрицательно влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Препарат противопоказан в период беременности и кормления грудью.

Способ применения и дозы

Только для наружного применения. Смазывают пораженные поверхности кожи (можно применять под окклюзионную повязку). Длительность лечения зависит от характера патологического процесса, его выраженности, достигнутого

эффекта. При гнойных отитах препарат закапывают в наружный слуховой проход (по 2-3 капли). Процедуру повторяют 1-2 раза в день, а при значительных выделениях, которые смывают нанесенный раствор - до 3-4 раз в день.

Дети

Не назначают детям в возрасте до 1 года.

Передозировка

При передозировке препарата возможно раздражение кожи и слизистых оболочек, местные аллергические реакции в виде высыпаний, зуда, покраснения и отека тканей, усиление проявлений других побочных реакций.

Побочные реакции

Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, в том числе кожные высыпания, зуд, дерматиты, жжение, гиперемия, ангионевротический отек, крапивница. В случае развития таких реакций применение препарата необходимо прекратить.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 25 мл во флаконе.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «ФИТОФАРМ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 84500, Донецкая обл., Г. Бахмут, ул. Сибирцева, 2.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).