

Состав

действующее вещество: 1 мл раствора содержит хлорофиллипта экстракта густого (10,76: 1) (экстрагент этанол 93%) 10 мг;

вспомогательные вещества: этанол (96%).

Лекарственная форма

Раствор спиртовой.

Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость зеленого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТХ D08A X.

Фармакодинамика

Препарат обладает антибактериальной активностью в отношении стафилококков, в том числе антибиотикоустойчивых штаммов.

Фармакокинетика

Не исследовалась.

Показания

Лечение заболеваний, вызванных антибиотикоустойчивыми штаммами стафилококков; ожоговая болезнь, трофические язвы и язвы конечностей, долго заживают, в комплексном лечении послеоперационных, послеродовых и другого происхождения септических состояний; при лечении стафилококковых дисбиоза кишечника и санации стафилококкового носительства, при эрозии шейки матки.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к хлорофиллипту или другим компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Следует учитывать, что при наличии в ране остатков перекиси водорода Хлорофиллипт выпадает в осадок. Поэтому после промывания раны перекисью водорода остатки его следует изъять стерильным 0,9% раствором натрия хлорида. Усиливает действие антисептических препаратов.

Особенности применения

Это лекарственное средство содержит 1484 мг / доза этанола (алкоголя). Вреден для пациентов, больных алкоголизмом. Следует соблюдать осторожность при применении у пациентов с заболеваниями печени и большим эпилепсией.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Поскольку препарат содержит этанол 96%, следует соблюдать осторожность при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Препарат не применять в период беременности и кормления грудью.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 12 лет препарат назначать внутрь, местно, в клизмах. Детям от 12 лет препарат применять по назначению врача.

Внутренне Хлорофиллипт применять при носительстве стафилококков в кишечнике и для профилактики послеоперационных осложнений. Взрослым и детям старше 12 лет принимать по 5 мл 1% спиртового раствора, разведенного 30 мл воды 3 раза в день за 40 минут до еды ежедневно. Продолжительность лечения определяется индивидуально в зависимости от эффективности терапии и тяжести заболевания.

Для лечения носительства стафилококков в кишечнике Хлорофиллипт назначать также в клизме (по 20 мл 1% спиртового раствора разводить в 1 л воды - это доза для одной клизмы). Процедуру проводить 1 раз в сутки. Клизму с препаратом ставить через каждые 2 дня. Курс лечения - 10 процедур.

Для местного применения (лечение ожогов и трофических язв) 1% спиртовой раствор разводят 0,25% раствором новокаина в пропорции 1: 5.

При лечении эрозии шейки матки предварительно осушать тампоном все складки слизистой оболочки влагалища и влагалищной части шейки матки и

смазывать 1% раствором хлорофиллипта канал шейки матки. Для спринцевания влагалища 15 мл 1% спиртового раствора разводить в 1 л воды.

Продолжительность лечения зависит от течения заболевания и определяется врачом индивидуально.

Дети

Препарат применять детям старше 12 лет по назначению врача.

Передозировка

Возможно усиление проявлений побочных реакций. Лечение - симптоматическое.

Побочные реакции

Аллергические реакции, включая сыпь, зуд, гиперемия, ангионевротический отек.

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

При температуре не выше 25 ° С в оригинальной упаковке.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 100 мл во флаконе в пачке.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Опытный завод» ГНЦЛС ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 61057, Харьковская обл., Город Харьков, улица Воробьева, дом 8.

(Общество с ограниченной ответственностью «Опытный завод» ГНЦЛС »)

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).