

Состав

действующее вещество: эфир поливинилбутиловый.

1 г Винилина® (Бальзама Шостаковского) содержит 1 г эфира поливинилбутилового.

Лекарственная форма

Жидкость накожная.

Основные физико-химические свойства: густая, вязкая жидкость от светло-желтого до коричневатого-желтого цвета со специфическим запахом. На воздухе не густеет и не высыхает. Легко растворяется в пропаноле и толуоле, практически не растворяется в воде и спирте этиловом 96 %. Смешивается во всех соотношениях с этиловым эфиром, хлороформом, маслами и жидким парафином.

Фармакотерапевтическая группа

Средство для лечения ран и язвенных поражений.

Код АТХ D03A X.

Фармакодинамика

Винилин® (Бальзам Шостаковского) обладает противомикробным действием, способствует очищению ран, регенерации и эпителизации тканей.

Фармакокинетика

Антисептическое действие обусловлено способностью препарата дегидратировать микробные клетки, вызывая коагуляцию белка и гибель микробных клеток. В результате восстановления происходит замещение очагов некроза специфической и/или соединительной (имеет самый высокий потенциал регенерации) тканью.

Показания

При фурункулах, карбункулах, трофических язвах, гнойных ранах, ранениях мягких тканей, ожогах, обморожениях, дерматитах и воспалительных заболеваниях кожи.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность организма к лекарственному средству.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не описано.

Особенности применения

Можно применять в виде 20 % масляного раствора, в том числе в сочетании с другими совместимыми с Винилином® лекарственными средствами (мазями на вазелиновой и других основах, пастами и кремами).

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Отсутствуют данные об отрицательном влиянии лекарственного средства на способность управлять автотранспортом и обслуживать движущиеся механические приспособления.

Применение в период беременности или кормления грудью

Информация о применении препарата в период беременности и кормления грудью отсутствует, применение препарата не рекомендуется.

Способ применения и дозы

Применять для смачивания салфеток и непосредственного нанесения на пораженную поверхность, в чистом виде или в виде 20 % раствора в персиковом либо других растительных маслах, а также в мазях. Частота применения – 3–5 раз в сутки.

Курс лечения определяется врачом индивидуально.

Дети

Информация о применении препарата детям отсутствует, применение препарата не рекомендуется.

Передозировка

Симптомы передозировки не описаны.

Побочные реакции

Очень редко - индивидуальная повышенная чувствительность к препарату: возможны аллергические реакции, в основном местного характера.

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 г в банках.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

АО «ВИТАМИНЫ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 20300, Черкасская обл., г. Умань, ул. Успенская, 31.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).