

Состав

1 саше содержит: коллаген (II типа) — 300 мг, хондроитина натрия сульфат — 300 мг, глюкозамина сульфат калия хлорид — 300 мг;

вспомогательные вещества: изомальт, ароматизатор лимонный натуральный, кремния диоксид коллоидный безводный.

Лекарственная форма

Свойства

Хондроитин и глюкозамин — природные вещества, которые в организме человека обеспечивают эластичность и упругость хрящевой ткани, кожи, сухожилий, связок и сосудов. Хондроитин — высокомолекулярный мукополисахарид, который в высоких количествах содержится в хрящах, костях и соединительной ткани. Снижение содержания хондроитина в тканях наблюдается при старении организма, а также при таких заболеваниях, как остеоартроз и остеохондроз. Глюкозамин участвует в формировании суставного хряща, сухожилий, связок и суставной жидкости.

Коллаген — волокнистый белок, который является основой для формирования коллагеновых волокон соединительной ткани — придает ей прочность и гибкость. Коллаген II типа — это основной строительный белок хрящевой ткани. Он составляет около 90% коллагена в суставном хряще. При нарушении образования коллагена могут возникать заболевания суставов, сухожилий, связок и кожи.

Показания

Суглобин IC рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник коллагена, хондроитина и глюкозамина, которые являются необходимыми компонентами для регенерации соединительной ткани, синовиальной жидкости и хрящевых компонентов суставов.

Противопоказания

Не употреблять при индивидуальной повышенной чувствительности к компонентам диетической добавки, в период беременности и кормления грудью, а также детям.

Перед употреблением диетической добавки рекомендуется проконсультироваться с врачом. Длительность употребления определяется врачом индивидуально.

Особенности применения

Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания.

Способ применения и дозы

Порошок из 1 саше растворить в стакане воды. Употреблять по 1 саше 1–3 раза в сутки за 20 мин до еды. Продолжительность курса составляет от 4 до 12 нед. Суточное количество коллагена II типа — 300–900 мг, хондроитина натрия сульфата — 300–900 мг, глюкозамина сульфата калия хлорида — 300–900 мг. Не следует превышать рекомендованные дозы.

Условия хранения

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в сухом, защищенном от света месте.

Упаковка

10 саше картонной коробке.

Производитель

ИнтерХим, Украина