

Состав

действующее вещество: хлорнитрофенол;

1 мл раствора содержит 10 мг хлорнитрофенолу;

вспомогательные вещества: триэтиленгликоль, этанол 96%, вода очищенная.

Лекарственная форма

Раствор для наружного применения.

Основные физико-химические свойства: прозрачная раствор от желтого до зелено-желтого цвета с легким запахом спирта.

Фармакотерапевтическая группа

Противогрибковые средства для местного применения. Код АТХ D01A E.

Фармакодинамика

Нитрофунгин - протимиозное средство для местного применения.

Лекарственное средство характеризуется антисептическим и дезинфицирующим действием в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, микобактерии, некоторые грибы. Активен в отношении возбудителя дерматомикозов. Действует фунгистатично.

Фармакокинетика

Фенол абсорбируется из желудочно-кишечного тракта, кожи, слизистых оболочек. Метаболизируется в фенилглюкуронид и в фенилсульфат. Небольшая часть фенола окисляется до катехоламинов и хинол. Метаболиты выводятся с мочой, которая может принимать светло-зеленого цвета.

Показания

Дерматомикозы, в частности эпидермофитии, трихофитии, кандидоз, микотическая экзема, микозы наружного слухового прохода.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к хлорнитрофенолу и другим компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Противомикробное действие фенола может быть снижена повышенным pH или при взаимодействии с веществами крови или другими органическими веществами.

Особенности применения

Если в течение трех дней применения препарата не наблюдается терапевтический эффект или проявления заболевания усиливаются, необходимо пересмотреть тактику лечения.

Места нанесения препарата следует защищать от воздействия прямого солнечного света.

Раствор содержит 42,4% (в объемном отношении) этанола.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Данный препарат не ухудшает способности управлять автомобилем и работать с механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

В период беременности и кормления грудью препарат можно применять только по назначению врача, который определит соотношение польза/риск.

Кормление грудью, следует избегать любого контакта ребенка с препаратом.

Способ применения и дозы

Применять взрослым и детям старше 15 лет. На пораженные участки кожи раствор наносить каплями или натирать 2-3 раза в день до полного исчезновения признаков заболевания. Очень большое влияние на результаты лечения имеет применение препарата также и после исчезновения признаков заболевания. Для профилактики рецидивов рекомендуется применять препарат 1-2 раза в неделю, 2-3 раза в день в течение 4 недель.

Обычная доза неразведенный раствор. Только в случаях с остро выраженными воспалительными проявлениями на коже или если в процессе лечения появляется раздражение кожи, препарат разводить водой в соотношении 1:1.

Дети

Препарат не применять детям до 15 лет.

Передозировка

Признаки передозировки могут проявиться при всасывании фенола поврежденной и неповрежденной поверхностью кожи в случае длительного действия на большую площадь кожного покрова. При случайном попадании фенола на кожу необходимо снять загрязненную одежду и промыть кожу большим количеством воды, а затем растительным маслом. Можно также применять макрогол 300 или масло эвкалипта.

Случайное глотание фенола приводит к местному отеку, появляется боль, тошнота, рвота, повышенное потоотделение и диарея. Сначала может наступить возбуждение, после которого пациент может потерять сознание. Угнетение центральной нервной системы и дальнейшая недостаточность сердечно-сосудистой и дыхательной систем могут привести даже к летальному исходу. Иногда наблюдается развитие ацидоза, редко - гемолиз и метгемоглобинемия с цианозом. Моча приобретает зеленый оттенок. Иногда наблюдается развитие отека легких, повреждения миокарда и вследствие этого - поражение почек и печени, что может привести к недостаточности функции этих органов.

В случае попадания фенола в желудок следует провести промывание желудка раствором, содержащим оливковое или другое растительное масло, которое разводит фенол и предотвращает его дальнейшей абсорбции. Можно также принимать активированный уголь. Не следует вызвать рвоту искусственно. Промывание желудка необходимо проводить теплой водой. Также эффективным является форсированный диурез. В случае гемолиза необходимо провести заместительную трансфузию крови.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции. В отдельных случаях может появиться раздражение кожи в месте нанесения препарата или повышенная чувствительность кожи к прямому солнечному свету. В случае появления этих нежелательных реакций необходимо посоветоваться с врачом относительно дальнейшего применения препарата.

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке для защиты от света и недоступном для детей месте.

Упаковка

По 25 мл во флаконе, по 1 флакону в коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Тева Чех Индастриз с.р.о.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Ул. Остравско 305/29, Комаров, 747 70 Опава, Чехия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).