

Состав

действующее вещество: салициловая кислота;

1 мл раствора содержит салициловую кислоту 20 мг;

вспомогательное вещество: этиловый спирт 70 %.

Лекарственная форма

Раствор накожный спиртовой.

Основные физико-химические свойства: бесцветная прозрачная жидкость со спиртовым запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Дерматологические средства. Код АТХ D01A E12.

Фармакодинамика

Антисептическое средство. При местном применении оказывает противомикробное, раздражающее, отвлекающее действие.

Показания

Применяют при инфекционных поражениях кожи: обычных угрях, пиодермии.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к препарату.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Местное применение салициловой кислоты не следует сочетать с пероральным применением препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту и другие нестероидные противовоспалительные средства. Не применять вместе с бензоил-пероксидом и местными ретиноидами.

Салициловая кислота может повысить проницаемость кожи для других лекарственных средств для местного применения и тем самым увеличить их попадание в организм. Кроме того, салициловая кислота может усилить нежелательное действие метотрексата и гипогликемическое действие пероральных противодиабетических препаратов производных сульфонилмочевины.

Если вы принимаете какие-либо другие лекарственные средства, обязательно сообщите об этом врачу.

Особенности применения

Не допускать попадания в глаза, не наносить на слизистые.

Не следует нарушать правила применения лекарственного средства – это может помешать здоровью.

Не следует наносить препарат на большие участки кожи.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

В период беременности и кормления грудью применение препарата возможно только тогда, когда ожидаемая польза матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способ применения и дозы

Применяют наружно, смазывая или растирая пораженные участки кожи ватным тампоном, пропитанным препаратом 2 – 3 раза в сутки. Курс лечения определяет врач в зависимости от течения и тяжести заболевания.

Дети

Не применяют детям до 12 лет.

Передозировка

При применении больших доз может усиливаться кератолитическое действие и аллергические реакции. В таком случае препарат необходимо смыть водой, обратиться за консультацией к врачу. Терапия симптоматическая.

Побочные реакции

Возможны изменения со стороны кожи: сухость, шелушение, раздражение, контактный дерматит, проявления аллергических реакций (крапивница, зуд), требующие отмены препарата.

При длительном применении возможно всасывание препарата в общее кровообращение и развитие характерных для салицилатов побочных эффектов: шум в ушах, головокружение, боль в эпигастрии, тошнота, рвота, ацидоз, дыхание.

При появлении любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!

Срок годности

3 года.

Не применять препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 25 мл во флаконе; по 1 флакону в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

АО «Фармак».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 04080, г. Киев, ул. Кирилловская, 74.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).