

Состав

действующее вещество: clotrimazol;

1 мл содержит клотримазола 10 мг;

вспомогательные вещества: пропиленгликоль, глицерин.

Лекарственная форма

Раствор для ротовой полости.

Основные физико-химические свойства: прозрачная вязкая жидкость без цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для применения в стоматологии.

Противомикробные и антисептические средства для местного применения.

Код АТХ А01А В18.

Фармакодинамика

Фармакологическое действие Кандида обусловлено свойствами клотримазола, входящего в его состав. Клотримазол - противогрибковое средство широкого спектра действия из группы производных имидазола. К клотримазолу чувствительны дерматофиты, дрожжевые грибы, а также плесневые грибы.

Эффект клотримазола связан с нарушением синтеза эргостерина, входящего в состав клеточной мембраны грибов, в результате чего изменяются структура и свойства мембран, наблюдается лизис клеток.

При местном применении лишь незначительные количества клотримазола всасываются в кровь, поэтому системные эффекты отсутствуют.

Фармакокинетика

При местном применении лишь незначительные количества клотримазола всасываются в кровь, поэтому системные эффекты отсутствуют.

Показания

Местное лечение кандидоза полости рта. Фарингомикоз.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к клотримазолу или другим компонентам препарата, включая пропиленгликоль и глицерин.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Данные отсутствуют.

Особенности применения

Препарат предназначен для приема внутрь, поэтому не следует глотать его при применении.

Предотвращать попадание препарата в глаза.

В некоторых случаях наблюдается бактериальная резистентность к клотримазолу. При отсутствии терапевтического эффекта лекарственного средства следует применить другой способ лечения.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Безопасность применения препарата этой категории пациентов не определена. Следует избегать применения препарата в первом триместре беременности.

Способ применения и дозы

10-20 капель Кандид[®] наносить на пораженные участки слизистой оболочки рта с помощью ватного тампона 3-4 раза в день. Все пораженные участки слизистой оболочки рта следует обработать препаратом. Обычно положительный результат от применения наблюдается на 3-5-й день лечения, однако в отдельных случаях лечение может быть продолжено, пока признаки инфекции не исчезнут полностью. Во время и после лечения особое внимание необходимо уделить устранению любых воздействий, которые могут привести к возвращению инфекции.

Курс лечения определяет врач.

Дети

Нет достаточных данных относительно применения препарата детям.

Передозировка

При рекомендуемом режиме применения возникновение симптомов передозировки невозможно.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции. Боль и раздражение на месте аппликации. Могут возникнуть обморок, артериальная гипотензия, одышка, сыпь на коже, крапивница, эритема, жжение, покалывание, зуд, отек, контактный дерматит.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 ° С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 15 мл препарата во флаконах с пробкой-капельницей и колпачком с контролем первого вскрытия, по 1 флакону в картонной упаковке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Гленмарк Фармасьютикалз Лтд./Glenmark Pharmaceuticals Ltd.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Участок № Е-37/39, Ем.Ай.Ди.Си., Сатпура, Насик - 422007, Индия/
Plot No E-37/39, M.I.D.C., Industrial Estate, Satpur, Nasik - 422007, India.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).