

Состав

действующее вещество: натамицин;

1 г крема содержит 20 мг натамицина;

вспомогательные вещества: децил олеат, воска цетилового эфир, спирт цетостеариловый, натрия лаурилсульфат, метилпарагидроксibenзоат (Е 218), пропилпарагидроксibenзоат (Е 216), пропиленгликоль, вода очищенная.

Лекарственная форма

Крем.

Основные физико-химические свойства: крем от белого до желтоватого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Противогрибковые препараты для местного применения. Антибиотики. Код АТХ D01A A02.

Фармакодинамика

Натамицин является полиеновым противогрибковым антибиотиком. Его противогрибковые свойства связаны с нарушением целостности клеточных мембран при взаимодействии на уровне синтеза стеролов. К натамицину чувствительны большинство патогенных грибов. *Candida albicans* чувствительна к натамицину.

Фармакокинетика

Натамицин активен при местном применении и практически не абсорбируется через кожу и мембраны слизистых оболочек.

Показания

Грибковые поражения кожи, вызванные *Candida albicans*.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестно.

Особенности применения

Наличие в составе препарата метилпарагидроксибензоат (Е 218) и пропилпарагидроксибензоат (Е 216) может вызвать аллергические реакции (возможно замедленные). Спирт цетостеариловый может вызвать местные кожные реакции (например контактный дерматит). Пропиленгликоль может вызвать раздражение кожи.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Препарат можно применять в период беременности и кормления грудью.

Способ применения и дозы

Крем наносить на пораженные участки кожи 1-4 раза в сутки ежедневно. Длительность терапии обычно составляет 2-3 недели.

Дети

Натамицин в лекарственной форме крем применять детям всех возрастов.

Передозировка

Нет данных.

Побочные реакции

Система организма	Редко($\geq 1/10\ 000$ - $< 1/1000$)
<i>Общие нарушения и изменения в месте применения</i>	Реакции гиперчувствительности, жжение, раздражение.

Реакции гиперчувствительности: в месте применения, жжение и раздражение могут возникать.

Если они продолжаются, это может быть следствием гиперчувствительности к консервантам (парагидроксибензоаты).

Сообщения о побочных реакциях

Сообщение о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства важны. Таким образом, можно постоянно оценивать соотношение пользы / риска для лекарственного средства.

Врачей просят сообщать обо всех подозреваемых побочных реакциях через национальную систему сообщений.

Срок годности

3 года.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 ° C. Не хранить в холодильнике или морозильнике. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 30 г в тубе, по 1 тубе в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Теммлер Италия С.р.л.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Виа делле Индастри, 2, 20061, Каругате (MI), Италия.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).