

Опис

Lorde Hyal - стерильний розчин для інгаляційного і інтраназального введення, який полегшує дихання шляхом розрідження і поліпшення виведення секрету слизової оболонки носа верхніх і нижніх дихальних шляхів у пацієнтів з запальними захворюваннями органів дихання за рахунок осматического ефекту.

Гіпертонічний розчин натрію хлориду(3%) - натуральний і безпечний інгаляційний муколітик. Також містить гіалуронову кислоту - для додаткового пом'якшення і зволоження слизової, а також зменшення подразнюючої дії гіпертонічного розчину солі при інгаляції.

Lorde Hyal в першу чергу показаний хворим з кашлем при:

- ларингіті;
- трахеїтах;
- муковісцидозі;
- бронхітах;
- бронхіолітах;
- бронхоектатичної хвороби;
- хронічної обструктивної хвороби легень.

Lorde Hyal також застосовується при гострих і хронічних захворюваннях носоглотки, носової порожнини і пазух, гіпертрофії аденоїдів у дітей, цілорічного та сезонного алергічного риніту для зменшення набряку слизової, розрідження секрету і полегшення дихання.

Без рецепта! Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією і проконсультуйтеся з медичним фахівцем.

Склад

1 мл розчину містить:

- натрію хлорид - 30 мг;
- натрію гіалуронат - 1 мг.

Протипоказання

Lorde Hyal протипоказаний при підвищеній індивідуальній чутливості до компонентам розчину.

Спосіб застосування

Використання за допомогою інгалятора.

Інгаляцію розчином можна проводити за допомогою небулайзера з використанням спеціальної маски на обличчя, загубника, загубника-соски або назальної канюлі.

При використанні дітям: застосовують дітям від народження. Використовують від 1 до 4 мл розчину. Доза, тривалість і частота використання визначається лікарем.

При використанні для дорослих: використовувати по одному контейнеру 2 рази в день. При необхідності частота використання може бути збільшена до 4 разів на день.

Підготуйте до використання небулайзер:

- відкрийте полімерний пакет і дістаньте одноразовий контейнер. Переконайтеся в тому, що контейнер не пошкоджений. Не діставайте контейнер з пакета, якщо в цьому немає необхідності.
- Струсіть контейнер, який дістали. інші контейнери залиште в полімерному пакеті і помістіть їх у картонну коробку.
- Утримуючи контейнер за верхній край, поверніть нижню сторону що б відкрити контейнер.
- Вставте контейнер в небулайзер відкритим краєм вниз і легко натисніть. Переконайтеся в тому, що розчин перетік в небулайзер.
- Зберіть небулайзер і користуйтеся за призначенням. Після використання помийте небулайзер, залишки розчину викидайте, згідно з місцевими вимогами по утилізації відходів.

Інтраназальне ведення.

Дітям до року - по 1-2 краплі в кожную ніздрю 2-3 рази на добу.

Дорослим і дітям від року - по 1 - 3 краплі в кожную ніздрю 3-4 рази на добу.

Дорослі. Перед початком процедури слід вимити руки з милом і акуратно звільнити носові проходи від секрету швидким різким видихом через ніс. Для запобігання витікання розчину, потрібно лягти або сісти і закинути голову назад, потім закапати розчин. Після закапування бажано полежати, закинувши назад голову протягом 2 хвилин.

Діти. Перед початком процедури слід вимити руки з милом і акуратно звільнити носові проходи дитини від слизу. Закапати розчин в кожный носовий прохід. При закапуванні в праву ніздрю голова дитини повинна бути закинута назад і

нахилена вліво і, навпаки, голова дитини повинна бути нахилена вправо при заковлюванні лівої ніздрі. Після заковпування слід посадити дитину і допомогти звільнити носові проходи від розрідженого слизу.

Побічні ефекти

У пацієнтів з індивідуальною непереносимістю компонентів розчину можуть виникати алергічний реакції.

В окремих випадках, можуть виникати гіперемія слизової оболонки носа, кашель або бронхоспазм.

Застереження

Суміш призначена для використання тільки шляхом інгаляційного або інтраназального введення.

Перше використання повинно відбуватися під контролем лікаря або кваліфікованого персоналу. Використання дітьми повинно відбуватися під наглядом дорослих.

У разі виникнення бронхоспазму, кашлю або при появі будь-яких інших побічних ефектів, слід припинити використання пристрою і повідомити лікаря.

Не використовуйте засіб, якщо контейнер був пошкоджений.

Не використовуйте засіб після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Призначений для одноразового використання.

Не змішувати з іншими розчинами або лікарськими засобами.

Термін придатності

2 роки.

Умови зберігання

Зберігати в захищеному від сонячних променів місці при температурі від 5 ° С до 25 ° С.