

Состав

действующее вещество: кислота борная;

100 мл раствора содержат кислоты борной 3 г

вспомогательные вещества: этанол 96%, вода очищенная.

Лекарственная форма

Раствор для наружного применения.

Основные физико-химические свойства: прозрачная, бесцветная жидкость с запахом спирта.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТХ D08A D.

Фармакодинамика

Препарат оказывает антисептическое действие. Коагулирует белки (в том числе ферменты) микробной клетки, нарушает проницаемость клеточной оболочки, благодаря чему задерживается рост и развитие бактерий.

Фармакокинетика

При наружном применении препарат абсорбируется через поврежденную кожу, раневую поверхность; при случайном приеме внутрь - через слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Кислота борная может накапливаться в тканях организма. выводится из организма медленно.

Показания

Пиодермия, мокнущая экзема, опрелости, острый и хронический средний отит.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к кислоте борной, нарушение функции почек, хронический мезотимпанит с нормальной или мало измененной слизистой оболочкой, травматические перфорации барабанной перепонки; период беременности и кормления грудью, в том числе для обработки молочных желез, детям (в том числе новорожденным).

Особые меры безопасности

Не использовать на обширные участки кожи, не применять для промывания полостей. Не допускать попадания препарата в глаза. Не следует нарушать правила применения лекарственного средства, это может повредить здоровью.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Взаимодействие пока неизвестна.

При одновременном применении любых других лекарственных средств следует сообщить врачу.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Препарат противопоказан в период беременности или кормления грудью.

Способ применения и дозы

Применять наружно. При пиодермии, опрелостях, экземе пораженные участки кожи обрабатывать с помощью салфетки, предварительно смоченной препаратом, 2 - 3 раза в сутки.

При отите в наружный слуховой проход вводить смоченные раствором турунды или закапывать по 3 - 5 капель 2-3 раза в сутки.

Дети

Детям препарат не применяют.

Передозировка

В случае случайного употребления внутрь провести зондовое промывание желудка, назначить внутрь солевые слабительные средства, энтеросорбенты (активированный уголь), симптоматическую терапию.

Симптомы острого отравления: тошнота, рвота, диарея, нарушение кровообращения и угнетение центральной нервной системы, снижение температуры тела, шок, кома, эритематозная сыпь. В случае тяжелого отравления принимают меры по поддержанию жизненно важных функций

организма, проводят гемодиализ или перитонеальный диализ, заменное переливание крови. При длительном применении препарата на больших по площади участках кожи могут возникать симптомы хронической интоксикации: отек тканей, истощения, стоматит, экзема, нарушение менструального цикла у женщин, анемия, судороги, алопеция. В этих случаях препарат отменяют, проводят симптоматическое лечение.

Побочные реакции

Применение препарата может вызвать аллергические реакции (покраснение кожи, зуд, крапивница, сыпь, отек). В единичных случаях - развитие анафилактической реакции, включая шок десквамация эпителия. При длительном применении и у пациентов с нарушением функции почек могут возникать тошнота, рвота, диарея, головная боль, спутанность сознания, олигурия, судороги.

В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!

Срок годности

3 года.

Препарат нельзя применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С. хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 20 мл во флаконе, без пачки.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

69063, Украина, г.. Запорожье, ул. Академика Амосова, 75.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).