

## **Состав**

*действующее вещество:* 1 мл раствора содержит Хлорофиллипта экстракт густой (*extractum chlorophyllipti spissum*) в пересчете на 100 % содержание сухого вещества (1:15,3) 10 мг;

*вспомогательное вещество:* этанол 96 %.

## **Лекарственная форма**

Раствор спиртовой.

*Основные физико-химические свойства:* жидкость темно-зеленого цвета. В процессе хранения допускается образования осадка.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Антисептики и дезинфицирующие препараты. Код АТХ D08A X.

## **Фармакодинамика**

Препарат имеет антибактериальную активность относительно стафилококков, в том числе антибиотикоустойчивых штаммов.

## **Фармакокинетика**

Не изучалась.

## **Показания**

Лечение заболеваний, вызванных антибиотикоустойчивыми штаммами стафилококков, ожоговая болезнь, трофические язвы и долго незаживающие язвы конечностей, в комплексном лечении послеоперационных, послеродовых и другого происхождения септических состояний, при лечении стафилококковых дисбиозов кишечника и санации стафилококковых носителей, эрозия шейки матки.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к хлорофиллипту или к другим компонентам препарата.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Следует учитывать, что при наличии в ране остатков перекиси водорода Хлорофиллипт выпадает в осадок. Поэтому, после промывания раны перекисью водорода остатки его следует изъять стерильным 0,9 % раствором натрия хлорида. Усиливает действие антисептических препаратов.

## **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Поскольку препарат содержит этанол 96 %, следует придерживаться осторожности при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

## **Применение в период беременности или кормления грудью**

Эффективность и безопасность при применении препарата в период беременности или кормления грудью не изучали, поэтому препарат не следует применять этой категории пациентов.

## **Способ применения и дозы**

Взрослым и детям с 12 лет препарат назначать внутрь, местно, в клизмах. Детям с 12 лет препарат применять по назначению врача.

Внутрь Хлорофиллипт применять при носительстве стафилококков в кишечнике и для профилактики послеоперационных осложнений. Взрослым и детям с 12 лет принимать по 5 мл 1 % спиртового раствора, разведенного 30 мл воды 3 раза в сутки за 40 минут до еды ежедневно. Длительность лечения определяется индивидуально в зависимости от эффективности терапии и тяжести заболевания.

При лечении носительства стафилококков в кишечнике Хлорофиллипт назначать также в клизме (по 20 мл 1 % спиртового раствора разводить в 1 л воды – это

доза для одной клизмы). Процедуру проводить 1 раз в сутки. Клизму с препаратом ставить через каждые 2 дня. Курс лечения состоит из 10 процедур.

Для местного применения (лечения ожогов и трофических язв) 1 % спиртовой раствор разводить 0,25 % раствором новокаина в пропорции 1:5.

При лечении эрозии шейки матки предварительно осушить тампоном все складки слизистой оболочки влагалища и влагалищной части шейки матки и смазать 1 % спиртовым раствором Хлорофиллипта канал шейки матки. Для спринцевания влагалища 15 мл 1 % спиртового раствора разводить в 1 л воды.

Продолжительность курса лечения зависит от хода заболевания и определяется врачом индивидуально.

## **Дети**

Препарат применять детям с 12 лет по назначению врача.

## **Передозировка**

Возможно усиление проявлений побочных реакций. Лечение – симптоматическое.

## **Побочные реакции**

*Со стороны иммунной системы:* при применении препарата возможны аллергические реакции, включая отек слизистых оболочек, гиперемию, зуд, сыпь.

## **Срок годности**

2 года.

## **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Упаковка**

По 100 мл во флаконе стеклянном или полимерном, по 1 флакону в пачке; по 100 мл в банке, по 1 банке в пачке.

**Категория отпуска**

**Производитель**

ПАО «Галичфарм».

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

**Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).