

Состав

действующее вещество: экстракт подорожника ланцетолистного жидкий (Plantaginis lanceolatae folium) (1:1) (экстрагент – этанол 20%);

100 мл сиропа содержат экстракт подорожника ланцетолистного жидкого (Plantaginis lanceolatae folium) (1:1) (экстрагент – этанол 20 %) 6,4 г;

другие составляющие: сахар; лимонная кислота, моногидрат; пектин яблочный; калия сорбат; масло мяты перечной; вода очищена.

Свойства

Основными действующими веществами подорожника ланцетолистного являются слизи, ирридоидные гликозиды (аукубин, катапол), фенолкарбоновые кислоты (хлорогеновая кислота) и их гликозиды (вербаскозид), сапонины, флавоноиды, танины. Благодаря этим веществам подорожник ланцетолистный имеет противовоспалительные, секретолитические и антибактериальные свойства. Разжижает мокроту, способствует отхаркиванию.

Рекомендации по применению

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам лекарственного средства.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействия

Не применять одновременно с противокашлевыми препаратами, поскольку это препятствует выделению разрезанной мокроты.

Особенности по применению

Если при применении данного лекарственного средства появляется одышка, лихорадка или гнойная мокрота, следует проконсультироваться с врачом.

«Подорожника сироп» содержит небольшое количество этанола (алкоголя), менее 100 мг/дозу.

Лекарственное средство содержит 1,62 об. % этанола. Доза 10 мл содержит 127 мг этанола, что соответствует примерно 1,3 мл вина и 3,2 мл пива. Доза 15 мл содержит 190 мг этанола, что эквивалентно 4,8 мл пива, 2 мл вина в дозе. Лекарственное средство вредно для пациентов, больных алкоголизмом. Следует быть осторожным при применении беременным и кормящим грудью, детям, пациентам из групп высокого риска, например с заболеваниями печени и больным эпилепсией. Следует избегать одновременного применения других лекарственных средств, содержащих этанол. Не следует превышать рекомендуемые дозы.

«Подорожник сироп» содержит сахар, поэтому следует с осторожностью применять больным сахарным диабетом.

«Подорожника сироп» содержит менее 1 ммоль (39 мг)/дозу калия, то есть практически свободен от калия.

«Путешественник сироп» содержит кислоту лимонную, поэтому с осторожностью применять препарат больным, страдающим гиперацидным гастритом, язвенной болезнью желудка с повышенной кислотностью, рефлюкс-эзофагитом.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Из-за отсутствия данных исследований это лекарственное средство не следует принимать в период беременности или кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Данные о влиянии лекарственного средства на способность управлять автотранспортом или работать с другими механизмами при применении в рекомендованных дозах отсутствуют.

Способ применения

Принимать препарат каждые 2–3 часа с одинаковыми интервалами между приемами (5–7 раз в сутки): детям от 3 до 6 лет – по 1/2 чайной ложки (2,5 мл), детям от 6 до 12 лет – по 1 чайной ложке (5 мл), взрослым и детям от 12 лет – по 1 столовой ложке (15 мл). Продолжительность лечения определяется индивидуально врачом, в среднем составляет 5-7 дней. Если в течение срока лечения состояние больного не улучшается, необходимо обратиться за консультацией к врачу

Дети.

Не рекомендуется применять детям до 3 лет.

Передозировка

При передозировке, например, при случайном приеме содержимого всего флакона могут возникнуть желудочно-кишечные расстройства.

Побочные эффекты

Аллергические реакции (в т. ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи), изжога, диарея.

В случае возникновения нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.

Срок годности

3 года.

Срок годности после открытия флакона – 3 месяца.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Форма выпуска

Сироп. По 100 мл или по 200 мл во стеклянном или полимерном флаконе в пачке вместе с мерным стаканчиком или без стаканчика.

Производитель

Производитель. ЧАО Фармацевтическая фабрика «Виола».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.

69063, Украина, г. Запорожье, ул. Академика Амосова, 75.