

Состав

действующее вещество: ихтиол;

1 г мази содержит ихтиола 100 мг;

вспомогательное вещество: парафин белый мягкий.

Лекарственная форма

Мазь.

Основные физико-химические свойства: мазь темно-бурого цвета с запахом ихтиола. По внешнему виду мазь должна быть однородной.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТХ D08A X.

Фармакодинамика

Фармакологические свойства мази ихтиоловой обусловлены действием биологически активных веществ ихтиола. Мазь ихтиоловая обладает антимикробным (бактерицидным и бактериостатическим), противовоспалительным и местнообезболивающим действием.

Фармакокинетика

При наружном применении ихтиол практически не абсорбируется в системный кровоток и не проявляет резорбтивного действия.

Показания

Ожоги, экзема, рожистое воспаление, невралгия, артриты.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При одновременном применении с препаратами для наружного применения могут образовываться новые соединения с непредсказуемым эффектом. Несовместим с растворами йодистых солей, алкалоидов, солей тяжелых металлов.

Особенности применения

Избегать попадания мази на слизистые оболочки.

Руки после нанесения мази следует тщательно вымыть для предотвращения попадания остатков мази в глаза, нос, рот.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами не описано.

Применение в период беременности или кормления грудью

Кормящим грудью женщинам не допускать попадания мази на соски. Безопасность и эффективность препарата в период беременности и кормления грудью не изучались.

Способ применения и дозы

Применяют наружно. Мазь наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 2-3 раза в сутки и прикрывают повязкой. Продолжительность курса лечения обусловлена течением заболевания и эффективностью терапии.

Для лечения рожистого воспаления и осложненных форм ожогов, артритов, невралгии, экземы используется в составе комплексного лечения.

Пользователь должен проконсультироваться с врачом, если симптомы заболевания не исчезли во время применения лекарственного средства или

наблюдаются побочные реакции, не указанные в инструкции по медицинскому применению лекарственного средства.

Дети

Опыт применения у детей не описан.

Передозировка

Сообщений о случаях передозировки не поступало.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции, раздражение кожи (жжение, зуд, сыпь, покраснение кожи), особенно в начале лечения и при длительном применении. При появлении сильного раздражения кожи или других необычных реакций применение мази следует прекратить.

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 30 г в тубах.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «ФИТОФАРМ», Украина.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 84500, Донецкая обл., Г. Бахмут, ул. Сибирцева, 2.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).