

Состав

Активное вещество: dipyridamole;

1 таблетка содержит 25 мг активного вещества;

вспомогательные вещества: лактоза, целлюлоза; оболочка: гипромеллоза, полисорбат 80, титани dioxide, макрогол 400.

Лекарственная форма

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Таблетки белого цвета, круглые, с рисунком «1» на одной стороне и «25» на другой.

Фармакотерапевтическая группа

Антиагрегационные препараты. Антиагрегационные средства.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Дипиридамола тормозит агрегацию тромбоцитов и улучшает микроциркуляцию, а также оказывает мягкое сосудорасширяющее действие.

Фармакокинетика.

После перорального применения быстро всасывается в пищеварительном тракте, преимущественно в желудке, незначительная часть – в тонком кишечнике.

Максимальная концентрация в крови регистрируется через 1 ч после приема.

Дипиридамола почти полностью связывается с белками плазмы крови.

Накапливается в сердце и эритроцитах. Метаболизируется путем связывания в печени с глюкуроновой кислотой. Период полувыведения составляет 20–30 минут, выводится дипиридамола в виде моноглюкуронида.

Показания

Лечение и профилактика нарушений мозгового кровообращения по ишемическому типу; дисциркуляторная энцефалопатия; профилактика артериальных и венозных тромбозов, а также их осложнений; профилактика тромбоэмболии после операции протезирования клапанов сердца; профилактика плацентарной недостаточности при осложненной беременности; в составе комплексной терапии при любых нарушениях микроциркуляции.

Противопоказание

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Распространенный стенозирующий атеросклероз коронарных артерий, острый инфаркт миокарда, декомпенсированная сердечная недостаточность, артериальная гипотензия (коллапс), тяжелые нарушения сердечного ритма, нестабильная стенокардия, субаортальный стеноз, геморрагические диатезы, заболевания со склонностью к кровотечениям (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки).

Особенности по применению

Взрослым и детям от 12 лет назначают по 75-225 мг (3-9 таблеток по 25 мг или 1-3 таблетки по 75 мг) в сутки, распределенные на несколько приемов. При тяжелых заболеваниях суточную дозировку можно повысить до 600 мг. Таблетку следует принимать натощак, не раскусывая и не разламывая и запивать жидкостью, например 1 стаканом воды. Лечение начинают с минимальных доз, которые постепенно повышают. Продолжительность лечения и дозировка устанавливает врач индивидуально, в зависимости от состояния больного, болезни и переносимости.

Способ применения и дозирование

Взрослым и детям от 12 лет.

Назначают 75-225 мг (3-9 таблеток по 25 мг или 1-3 таблетки по 75 мг) в сутки, распределенные на несколько приемов. При тяжелых заболеваниях суточную дозировку можно повысить до 600 мг. Таблетку следует принимать натощак, не раскусывая и не разламывая и запивать жидкостью, например 1 стаканом воды. Лечение начинают с минимальных доз, которые постепенно повышают. Продолжительность лечения и дозировка устанавливает врач индивидуально, в зависимости от состояния больного, болезни и переносимости.

Дипиридамол можно применять для длительного лечения.

Передозировка

Симптомы передозировки: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, снижение артериального давления, брадикардия, одышка, отеки. Лечение: промывание желудка, прием активированного угля, симптоматическая терапия.

Побочные эффекты

Частые побочные эффекты: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, снижение артериального давления, брадикардия, одышка, отеки. Редкие побочные эффекты: аллергия, кровотечения, нарушение функции почек, печени, нервной системы.

?? ??????? ????? ? ?????????????? ??????: ????? ????? ????????????? ?????????? ??
?? ??????? ???????-???????????????? ??????? ? ????????????????? ??????: ????? ? ???????.
?? ??????? ????????????????????? ??????: ?????????????? ????????????????? ? ?????? ???????
????? ??????????: ?????? ??????????.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами

Даже в случае надлежащего применения дипиридамол может косвенно
нарушать способность управлять автотранспортом или работать с другими
механизмами, поскольку может измениться реакция вследствие снижения АД.

Упаковка

????????? ?? 25 ??: ?50 ? ?????? ??? ?????????????; ? 50 ? ?????? ??? ????????????? ?
????????? ?? 75 ??: ?40 ? ?????? ??? ?????????????; ? 40 ? ?????? ??? ????????????? ?

Производитель

????????? ? ?????????????? ?????????????????? «????????? ?????? «?????».
????????? ? ?????????????? ?????????????????? «????????????????????? ?????????? ??????????».
????????????????????? ?????????????????? ? ??? ?????? ?????? ?????????????????? ???????????????.
?????????, ?????????????? ???., ?????? ?????????, ?????? ??????????, ??? 8.
(????????? ? ?????????????? ?????????????????? «????????? ?????? «?????»)
????????, 61013, ?????????????? ???., ?????? ?????????, ?????? ?????????, ??? 22.
(????????? ? ?????????????? ?????????????????? «????????????????????? ?????????? «?????????»

Срок годности

4 года

Применение в период беременности или кормления грудью

????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????? ?????? ?????? ?????, ??? ????? ??????????

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействия

??????????? ??????????, ?????????????? ? ???? ??? ???, ?????? ??????????? ?????????? ?
 ??????????? ??????????, ??? ??? ?????????????????? ?????????????? ?????????????? ? ??????????
 ?????????????? ?????? ??????????? ?????????? ?????????????????????????? ?????????? ? ??????????? ?
 ?????????????? ?????????????? ?????????????????? ?????????????? ? ?????? ?????? ? ?????????????? ?
 ?????????????? ?????? ?????? ?????????????????? ?????????????? ?????????????????? ? ?????? ?????????? ?
 ??? ?????????????? ?????????????? ? ?????????????????????????? ?????????? ??? ?????????????????????? ?
 ?????????????????? ?????????????? ? ?????????????????? ?????????????? ?????? ?????????? ??????????????????