

Склад

діючі речовини: йод, калію йодид;

1 г розчину містить йоду 10 мг, калію йодиду 20 мг;

допоміжні речовини: гліцерин, вода очищена.

Лікарська форма

Розчин.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора сиропоподібна рідина червонувато-бурого кольору із запахом йоду.

Фармакотерапевтична група

Препарати, що застосовуються при захворюваннях горла. Антисептики. Код АТХ R02A A20.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Люголя розчин чинить бактерицидну дію за рахунок вмісту в ньому вільного йоду. Препарат чинить протимікробну дію на грампозитивні та грамнегативні бактерії, у тому числі на стрептококи, стафілококи, кишкову паличку, клебсієли, вульгарний протей.

Показання

Запальні захворювання слизових оболонок глотки та гортані: ларингіт, тонзиліт, фарингіт.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Тяжкі захворювання печінки та нирок, виражена гіперфункція щитовидної залози, декомпенсована серцева, ниркова або печінкова недостатність; дослідження або терапія радіоактивним йодом (за 2 тижні перед та після дослідження або терапії).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

Не застосовувати одночасно з розчином перекису водню та іншими дезінфікуючими засобами.

Особливості щодо застосування

Препарат не призначений для прийому внутрішньо. Не слід вдихати та/або проковтувати препарат. Не допускати потрапляння препарату в очі. З обережністю застосовувати при ларингіті через можливість ларингоспазму; при туберкульозі, геморагічних діатезах.

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу – це може зашкодити здоров'ю.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Протипоказано.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не виявлена.

Спосіб застосування та дози

Для зовнішнього застосування!

Тампоном, змоченим у препараті, змащувати уражені слизові оболонки глотки та гортані 3-4 рази на добу.

Тривалість курсу лікування залежить від перебігу захворювання та його тяжкості.

Діти Не застосовувати дітям до 5 років.

Передозування

Можлива поява йодизму (нежить, кропив'янка, набряк Квінке, слъозотеча, слиновиділення, висипання, м'язова слабкість, загальмованість).

Лікування. Негайне припинення застосування препарату та симптоматична терапія.

Побічні ефекти

При тривалому застосуванні можуть з'явитися явища йодизму (нежить, кропив'янка, набряк Квінке, слъозотеча, слинотеча, висипи на шкірі, м'язова слабкість, загальмованість).

Термін придатності

3 роки.

Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 25 г у флаконах або по 25 г у флаконі в пачці.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».