

Состав

100 г раствора содержат 2-пропанол - 63 г, бензалкония хлорид - 0,025 г

вспомогательные вещества: красители: оранжево-желтый S (Е 110), хинолин желтый (Е 104), бриллиантовый черный BN (Е 151), вода очищенная.

Лекарственная форма

Раствор накожный, спиртовой.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТС D08A X53.

Средство обладает пролонгированным бактерицидным (в т. ч. по отношению к MRSA / EHEC1) и других антибиотикорезистентных бактерий), фунгицидное, туберкулоцидное действие. Инактивирует вирусы гепатита В и С, ВИЧ, герпеса типа 1, ротавирусы, вакцинированные вирусы тому подобное. Спиртовая составляющая препарата одновременно с быстрым эффектом антимикробного действия обеспечивает обезжиривание и очистку кожи, а также проникновение бензалкония хлорида в глубокие слои кожи, за счет чего обеспечивается пролонгированное действие препарата. Кутасепт® Г способствует эффективному прилипанию хирургической пленки после высыхания средства.

Показания

Пред- и послеоперационная обработка кожи и операционных швов, антисептическая обработка кожи перед инъекциями, забором крови, пункциями, мелкими хирургическими вмешательствами, при мелких травмах и инфекциях кожи бактериальной и грибковой этиологии. Гигиеническая и хирургическая обработка кожи рук.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Не применять для антисептической обработки слизистых оболочек. Не допускать контакта со слизистыми оболочками глаз.

Применение в период беременности или кормления грудью

В период беременности и кормления грудью применение возможно после консультации с врачом.

Способ применения и дозы

Кутасепт® Г - готовый раствор для наружного применения. Благодаря интенсивному цвету хорошо маркирует операционное поле. Место манипуляции или пораженный участок необходимо полностью увлажнить препаратом. Антисептическая обработка и очистка кожи перед инъекциями: - кожа с большим количеством сальных желез (400-900 желез / см²). Для поверхностей ладоней действуют рекомендации по антисептической обработке кожи рук.

Дети

Нельзя применять препарат для обработки кожи новорожденным и недоношенным детям. В других случаях препарат применяют по назначению врача.

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

Легковоспламеняющийся препарат. Следует соблюдать правила техники безопасности при работе со спиртосодержащими средствами. Хранить при температуре не выше 25 ° С в местах, недоступных для детей.

Упаковка

Флакон по 1000 мл.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Боде Хеми ГмбХ.