

Склад

Наповнювачі: мікрокристалічна целюлоза, дикальцію фосфат; пірофосфат заліза, вітамін С (L-аскорбінова кислота), стабілізатор гідроксипропілметилцелюлоза, бісгліцинат заліза, сульфат заліза, антиспікаючі агенти: моно- та дигліцериди жирних кислот, солі магнію жирних кислот, силікону діоксид; стабілізатор гідроксипропілцелюлоза, антиспікаючі агенти: кроскармелоза натрію, полівінілполіпіролідон; барвники: оксид заліза жовтий, оксид заліза червоний.

Інгредієнти	Кількість на 1 таблетку
«Швидкий» шар. 1 фаза - вивільнення за 5 хвилин	
Бісгліцинат заліза	50,00 mg (мг)
в т.ч. Залізо	10,00 mg (мг)
«Середній» шар. 2 фаза - вивільнення до 45 хвилин	
Сульфат заліза	31,65 mg (мг)
в т.ч. Залізо	10,00 mg (мг)
вітамін С (L-аскорбінова кислота)	86,15mg (мг)
в т.ч. Вітамін С	70,00 mg (мг)
«Пролонгований» шар. 3 фаза - повне вивільнення протягом 8 годин	
Пірофосфат заліза	125,00 mg (мг)
в т.ч. Залізо	10,00 mg (мг)

Опис

ЗЕСТ ФЕРРУМ Ретард – це комплекс, що містить у своєму складі комбінацію із 3 видів заліза - бісгліцинату заліза, сульфату заліза та пірофосфату заліза - для

профілактики залізодефіцитних анемій різного походження, що супроводжуються дефіцитом заліза. ЗЕСТ ФЕРРУМ Ретард розроблений за інноваційною технологією MULTI-LAYER*, що сприяє роздільному вивільненню компонентів протягом усього дня та їх кращому засвоєнню.

** Технологія МУЛЬТИ-ЛАЄР.*

3 шари таблетки - роздільне вивільнення - краще засвоєння:

тришарова технологія MULTI-LAYER* забезпечує вивільнення компонентів у три етапи:

«Швидкий» шар з бісгліцинатом заліза вивільняється за 5 хвилин і всмоктується у верхніх відділах дванадцятипалої кишки, що сприяє зменшенню подразнювальної дії на шлунок та його кращому засвоюванню, тим самим сприяючи насиченню крові залізом.

«Середній» шар починає діяти через 45 хвилин та містить **сульфат заліза** (завдяки його всмоктуванню в дванадцятипалій кишці, зменшується негативний вплив на слизову шлунка) та

Вітамін С, який сприяє кращому всмоктуванню заліза.

«Пролонгований» шар вивільняється протягом 8 годин та містить мікроенкапсульований пірофосфат заліза, всмоктування якого не залежить від рН кишкового вмісту, що сприяє, своєю чергою, кращому всмоктуванню заліза з кишківника та створенню оптимальних концентрацій заліза в організмі людини.

Дія ЗЕСТ ФЕРРУМ Ретард зумовлена особливостями компонентів, що входять до його складу:

Бісгліцинат заліза завдяки кращому засвоєнню, на відміну від інших солей заліза, нормалізує кількість гемоглобіну в крові та не спричиняє побічних дій (таких, як закріп, діарея, болі в животі тощо).

Пірофосфат і сульфат заліза мають різні ступені біозасвоєння, завдяки чому всмоктування заліза в кишечнику відбувається в різний час, в результаті чого створюються умови для поступового і тривалого ефекту.

Залізо бере активну участь у реалізації багатьох функцій в організмі: в утворенні червоних кров'яних клітин (еритроцитів), в реалізації когнітивної функції, в процесі енергетичного обміну, в процесі поділу клітин тощо.

Вітамін С покращує засвоєння заліза організмом і сприяє метаболізму фолієвої кислоти, бере активну участь у побудові тканин, зміцнює стінки судин, має

сильні антиоксидантні й антиагрегантні властивості, покращує мікроциркуляцію в органах і тканинах організму людини.

Якщо лікар не призначив інакше, дотримуйтеся таких рекомендацій.

Рекомендації щодо застосування

Використовуйте ЗЕСТ ФЕРРУМ Ретард як дієтичну добавку до раціону харчування:

- при підвищеній потребі в залізі
- при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, що супроводжуються порушенням всмоктування заліза;
- при захворюваннях, що супроводжуються крововтратами;
- при та після хірургічних операцій та після травм, що супроводжується крововиливами.

Спосіб застосування

Вживати дорослим по 1 таблетці на добу, запиваючи достатньою кількістю води.

Термін споживання узгоджувати з лікарем. Подальші курси та періодичність повторних курсів визначає лікар індивідуально.

Застереження

Підвищена чутливість до окремих компонентів продукту.

Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед початком вживання дієтичної добавки та при одночасному застосуванні будь-яких лікарських засобів обов'язкова консультація лікаря.

Не застосовувати дітям.

Вагітність та лактація: можливе використання під час вагітності та в період годування груддю після консультації з лікарем.

Не є лікарським засобом. Дієтична добавка.

Форма випуску

Тришарові таблетки у банці № 30, упаковані в картонну коробку, з інструкцією.

Маса нетто 1 тришарової таблетки: 835 mg (мг) $\pm$ 7,5%.

Умови зберігання

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C у сухому, захищеному від прямих сонячних променів і недоступному для дітей місці.

Виробник

Виробник: Виробник: S.I.I.T S.r.l./C.I.I.T. С.р.л., Італія, Via Аріосто 50/60, 20090, Треццано суль Навігліо, Мілан для Delta Medical Promotions AG/Дельта Медікел Промоушнз АГ, Отенбахгассе, 26, Цюрих CH-8001, Швейцарія. www.zest-vitamins.com. для www.zest-vitamins.com.

Імпортёр: ТОВ «Дельта Медікел», 08132, Україна, м. Вишневе, вул. Чорновола, 43

Представник в Україні

Представництво «Дельта Медікел Промоушнз АГ», Україна, 08132, м. Вишневе, вул. Чорновола, 43