

Состав

действующее вещество: экстракт жидкий (1: 9,1) из смеси лекарственного растительного сырья: аира корневищ (*Acorus calamus rhizomata*) - 0,651 мг, корневищ с корнями левзеи сафлоровидной (крупноголовника) (*Rhizomata cum radicibus Leuze* тысячелистника травы (*Millefolii herba*) - 0,87 мг, полыни горькой (*Absinthii herba*) - 0,129 мг, мяты листьев (*Menthae piperitae folium*) - 0,27 мг, бобовника трехлистных листьев (*Menyanthidis trifoliatae folium*) - 0,129 мг, липы цветков (*Tiliae flos*) - 0,756 мг, укропа пахучего плодов (*Anethi graveolentis fructus*) - 0,369 мг, дуба коры (*Quercus cortex*) - 0,066 мг, (экстрагент этанол 40 %) - 30 мкл;

вспомогательные вещества: сахар, колер, этанол 96 %, вода очищенная.

цвет: сахар, вода очищенная;

1 мл препарата содержит 0,37 мл этанола.

Лекарственная форма

Бальзам для перорального применения.

Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость золотисто-коричневого цвета со специфическим запахом. При хранении допускается выпадение осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Тонизирующие средства.

Код АТХ А13А.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Фармакологические свойства бальзама обусловлены действием входящих в его состав компонентов. Бальзам Вигор содержит эфирные масла, дубильные вещества, флавоноиды, каротин, органические кислоты, лактоны, фитонциды. Лекарственное средство оказывает адаптогенное, антистрессовое, антитоксическое, противовоспалительное действие, улучшает умственную и физическую работоспособность, способствует пищеварению, нормализации функций сердечно-сосудистой системы. Повышает резистентность организма к различным эндо- и экзотоксическим факторам, гипоксии, активирует ретикуло-эндотелиальную систему, обладает определенным иммунокорректирующим эффектом и антиаллергическими свойствами. Не оказывает негативного воздействия на жизненно важные органы и системы.

Показания

Физические и эмоциональные перегрузки, стрессы, астено-вегетативный синдром (повышенная утомляемость, снижение работоспособности, неврастения, нарушение сна). Заболевания, требующие коррекции иммунного статуса, период реконвалесценции после тяжелых инфекционных заболеваний при хронических заболеваниях пищеварительного тракта. Бальзам назначают в качестве профилактического средства лицам, работающим в условиях воздействия химических, лучевых и температурных факторов.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонент лекарственного средства. Алкоголизм, тяжелые формы ишемической болезни сердца и эссенциальной гипертензии, выраженные нарушения функции печени и почек. Гиперчувствительность к растениям семейства астровых (сложноцветные). Поллиноз. Повышенная кислотность желудочного

сока. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки, желчнокаменная болезнь; наличие в анамнезе кровотечений из органов малого таза; анемия; эпилепсия. Повышенная свертываемость крови, склонность к тромбообразованию. Спазмофилия, бронхиальная астма.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Снижает эффективность антацидов, блокаторов H_2 -рецепторов (ранитидина, фамотидина).

Особенности по применению

Лекарственное средство содержит 34,5% (об/об) этанола (алкоголя), то есть 5,4-8,1 г/дозу, что эквивалентно 250 мл пива, 130 мл вина в дозе.

Такое количество алкоголя может оказывать влияние на действие других лекарственных средств.

Бальзам содержит сахар, поэтому его с осторожностью назначают больным сахарным диабетом.

С осторожностью применять пациентам с желудочно-пищеводным рефлюксом (из-за возможного возникновения и/или усиления изжоги).

Применение в период беременности или кормления грудью.

Противопоказано.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

В период применения лекарственного средства запрещается водить автомобиль или работать с потенциально опасными механизмами.

Способ применения и дозы

Лекарственное средство назначают взрослым. Принимают внутрь по 20–30 мл 2–3 раза в сутки во время еды. Курс лечения обычно составляет 7–14 дней, по назначению врача может быть продлен до 30 дней.

Дети.

Не используют детям.

Передозировка

Усиление проявлений побочных реакций, головокружение, тахикардия, боли в области сердца.

При значительном превышении дозы возможно возникновение алкогольной интоксикации, что требует прекращения приема и проведения симптоматической терапии.

При длительном применении лекарственного средства в дозах, превышающих рекомендуемые: повышение артериального давления, головные боли, развитие зависимости от алкоголя.

Длительное применение бальзама может вызвать так называемую полынную эпилепсию; абсинтин, содержащийся в полыни, при длительном употреблении может вызвать атонию кишок, контактный дерматит.

Побочные эффекты

При индивидуальной непереносимости компонентов лекарственного средства возможны аллергические реакции.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: гиперемия, кожная сыпь, крапивница, зуд, отек кожи. В таких случаях бальзам следует отменить.

Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота.

При появлении любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!

Сообщения о случаях побочных реакций.

Сообщение о побочных реакциях после регистрации лекарственного средства имеет важное значение. Это позволяет проводить мониторинг соотношения польза/риск при применении этого лекарственного средства. Медицинским и фармацевтическим работникам, а также пациентам или их законным представителям следует сообщать о всех случаях подозреваемых побочных реакций и отсутствии эффективности лекарственного средства через Автоматизированную информационную систему по фармаконадзору по ссылке: <https://aisf.dec.gov.ua>.д

Срок годности

2 года.

Не применять лекарственное средство по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 100 мл в банках, по 200 мл во флаконах, по 200 мл, 250 мл или 500 мл в бутылках.

Категория отпуска

Без рецепта – по 100 мл, 200 мл.

По рецепту – по 250 мл, по 500 мл.

Производитель

ЧАО «Биолик».

**Местонахождение производителя и его адрес места
осуществления деятельности.**

Украина, 24321, Винницкая обл., г. Ладыжин, ул. Независимости, 131,
III.

Заявитель

ООО «Украинская фармацевтическая компания».

Местонахождение заявителя.

Украина, 02660, г. Киев, ул. Старосельская, 1 У.