

Состав

действующее вещество: 1 таблетка содержит алтея травы (*Althaea officinalis* L.) экстракта сухого 1:40 (экстрагент – вода питьевая) – 100 мг;

вспомогательные вещества: магния карбонат легкий, аспартам (Е 951), кислота винная, повидон, сахароза, кальция стеарат, кремния диоксид коллоидный безводный, ароматизатор (апельсин).

Лекарственная форма

Таблетки жевательные.

Основные физико-химические свойства: таблетки серовато-бурого цвета с вкраплениями, круглой формы с плоской поверхностью, риской и фаской.

Фармакотерапевтическая группа

Отхаркивающие средства.

Код АТХ R05C A05.

Фармакодинамика

Алтейка Галичфарм – эффективное отхаркивающее средство, действие которого обусловлено секретолитическими и бронхолитическими свойствами. Препарат оказывает умеренное противокашлевое действие, уменьшает количество приступов кашля и их интенсивность. Нормализует измененную бронхолегочную секрецию, улучшает выделение мокроты: уменьшает ее вязкость и адгезивные свойства, облегчает продвижение мокроты из нижних в верхние отделы дыхательных путей и ее отхаркивание.

Лекарственное средство Алтейка Галичфарм нетоксично и не оказывает местного раздражающего эффекта.

Показания

Кашель при острых и хронических заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся образованием густого и вязкого бронхиального секрета и/или нарушением его отхаркивания: бронхиты, пневмонии, бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

На данный момент информация о лекарственных взаимодействиях Алтейки Галичфарм отсутствует. Не назначать одновременно с препаратами, угнетающими кашель (кодеин).

Препарат можно одновременно принимать с другими противокашлевыми и отхаркивающими средствами.

Особенности применения

Иногда у пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями легких в начале лечения Алтейкой Галичфарм может повышаться вязкость мокроты за счет отделения мокроты, накопившейся в бронхиальном дереве и содержащей большое количество детрита, белков и воспалительных элементов. Поэтому при диффузном поражении бронхов, значительных изменениях физико-химических свойств мокроты и снижении мукоцилиарного транспорта терапию Алтейкой Галичфарм необходимо сочетать с назначением муколитических препаратов (бромгексина).

Препарат содержит сахарозу, что необходимо учитывать больным сахарным диабетом. Также не следует назначать препарат пациентам с такими редкостными наследственными заболеваниями, как непереносимость фруктозы, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции или недостаточность сахаразы-изомальтазы.

В связи с содержанием аспартата в составе лекарственного средства его нельзя применять больным фенилкетонурией.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Лекарственное средство не влияет на быстроту реакции при управлении автотранспортом или работе с другими опасными механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Опыт применения в период беременности или кормления грудью отсутствует.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям с 12 лет назначать по 1 таблетке 4 раза в сутки до еды. Таблетки следует разжевывать и запивать небольшим количеством воды.

Доза для детей с 3 до 12 лет – 1 таблетка 3 раза в сутки.

Курс лечения – от 7 дней до 1–2 месяцев, в зависимости от формы заболевания.

Дети

Препарат не применяют детям до 3 лет.

Передозировка

При применении указанных терапевтических доз препарата передозировка невозможна. При длительном применении или передозировке могут возникнуть тошнота и рвота.

Терапия симптоматическая.

Побочные реакции

В некоторых случаях возможны аллергические реакции, включая крапивницу, зуд.

В случае возникновения каких-либо нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 таблеток в блистере, 2 блистера в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ПАО «Киевмедпрепарат».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 01032, г. Киев, ул. Саксаганского, 139.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).