

Состав

действующее вещество: бриллиантовый зеленый;

100 мл раствора содержит бриллиантового зеленого – 1 г;

вспомогательное вещество: этанол 60%.

Лекарственная форма

Раствор для наружного применения, спиртовой 1%.

Основные физико-химические свойства: жидкость интенсивно зеленого цвета с запахом спирта.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТХ D08A X.

Фармакодинамика

Антисептическое средство для наружного и местного использования. Оказывает антимикробное действие.

Препарат активен в отношении грамположительных бактерий.

Фармакокинетика

Препарат местного действия. Данных об всасывании в кровь и включении в метаболические процессы организма нет.

Показания

Гнойно-воспалительные процессы кожи (пиодермия, фурункулез, карбункулез, блефарит) легкой формы, а также обработка операционного поля, кожных покровов после операций и травм.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Особые меры безопасности.

Не допускать попадания в глаза.

Не следует нарушать правила применения лекарственного средства – это может помешать здоровью.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При одновременном применении с препаратами для наружного использования, содержащими органические соединения, может денатурировать белки, образовывать новые соединения.

Несовместим с дезинфицирующими препаратами, содержащими активный йод, хлор, щелочи (в том числе раствор аммиака).

При одновременном применении других лекарственных средств для местного применения следует сообщить врачу.

Особенности применения

Не следует допускать попадания раствора на слизистые, поскольку спирт, содержащийся в препарате, может вызвать ожоги, сильное раздражение. Активность препарата существенно снижается в присутствии сыворотки крови.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Применяют.

Способ применения и дозы

Наносить на поверхность кожи, при нарушении ее целостности охватывать окружающие здоровые ткани. При заболеваниях глаз смазывать края век.

Дети

Применяют.

Передозировка

Не наблюдалось.

Побочные реакции

Аллергические реакции (включая зуд, крапивницу). При попадании раствора на слизистую глаза возникает жжение, слезотечение, могут появиться ожоги.

В случае возникновения любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!

Срок годности

2 года.

Препарат нельзя применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 20 мл во флаконах-капельницах.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Публичное акционерное общество "Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод".

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 03134, г. Киев, ул. Мира, 17.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).