

Состав

действующие вещества: кислота борная, ментол;

1 г мази содержит кислоты борной 0,05 г, ментола 0,005 г

вспомогательные вещества: парафин белый мягкий.

Лекарственная форма

Мазь.

Основные физико-химические свойства: мазь белого или светло-желтого цвета с характерным запахом. По внешнему виду мазь должна быть однородной.

Фармакотерапевтическая группа

Препараты борной кислоты. Код АТХ D08A D.

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для местного применения. Оказывает антисептическое и обезболивающее действие.

Фармакокинетика

При наружном применении Бороментол практически не абсорбируется в системный кровоток.

Показания

Зуд кожи, невралгии, ринит.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, тяжелые нарушения функции почек.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не выявлено.

Особенности применения

Не наносить на слизистую оболочку носа.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Препарат не влияет на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Препарат противопоказан в период беременности. Во время кормления грудью применять при условии, что ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка.

Способ применения и дозы

Мазь наносить в небольших количествах на пораженные участки кожи, при рините - на кожу крыльев носа и легко втирать. Частота нанесения и длительность применения зависит от достигнутого эффекта и переносимости препарата.

Дети

Противопоказан детям в возрасте до 3 лет. В этом возрасте возможна рефлекторная остановка дыхания.

Передозировка

При длительном применении с препаратами для наружного применения на большие пораженные поверхности возможны проявления симптомов острого отравления, такие как тошнота, рвота, диарея, нарушение кровообращения и угнетение центральной нервной системы, снижение температуры тела, кожная сыпь, шок, кома. При длительном применении возможны проявления симптомов хронической интоксикации: истощение, стоматит, экзема, местный отек тканей, нарушение менструального цикла, анемия, судороги, алопеция.

Лечение симптоматическое. Показаны гемотрансфузия, гемо- и перитонеальный диализ. В случае случайного приема внутрь провести зондовое промывание желудка, назначить внутрь солевые слабительные средства, энтеросорбенты (активированный уголь), симптоматическую терапию. В случае тяжелого

отравления принять меры по поддержанию жизненно важных функций организма.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции, включая покраснение кожи, зуд, крапивница, сыпь, отек, контактный дерматит, развитие анафилактических реакций, в том числе шока, десквамации эпителия. При нанесении на большие участки кожи возможны рвота, диарея, головная боль, спутанность сознания, почечная недостаточность.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 25 г в тубах алюминиевых в пачках из картона или без пачек из картона.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «Тернофарм», Украина.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 46010, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).