

Склад

Автолізат пивних дріжджів - 254 мг, кальцій - 50 мг, магній - 10 мг.

Властивості

Дріжджі пивні ОСОКОР® з кальцієм і магнієм є природним джерелом вітамінів групи В (В1, В2, В3, В5, В6, В12), вітаміну Е, біотину, холіну, інозиту, макро- і мікроелементів, ненасичених жирних кислот, пектинів і амінокислот. Вітаміни групи В входять до складу безлічі ферментів і беруть участь в біохімічних перетвореннях, за допомогою яких утворюється енергія необхідна для нормального функціонування органів детоксикації, а також імунної системи. Вітамін Е виводить токсини і інші шкідливі речовини з організму, перешкоджає утворенню канцерогенів, бере участь у формуванні м'язової тканини. Холін необхідний для нормального функціонування нервової системи, входить до складу миєлінової захисної оболонки нервів. Основна корисна властивість вітаміну В8 (інозиту) - активізація ліпідного обміну, тому інозит особливо необхідний тим, хто схильний до фізичних навантажень. Біотин вкрай необхідний для оптимальної роботи нервової системи, клітини якої потребують глюкози, як в основному джерелі живлення. Бере участь у метаболізмі ліпідів і сприяє спалюванню жиру в організмі. Кальцій в організмі бере участь в організації жорстких конструкцій (опорна функція кісток), а також виконує роль стимулятора збудливості нервової тканини і скоротливості м'язових волокон.

Магній бере участь в таких процесах життєдіяльності організму, як:

- утворення нових клітин;
- робота серцево-судинної системи (магній навіть називають «мінералом серця»);
- зміцнення нервової системи;
- робота мозку;
- травлення;
- здорова робота нирок;
- правильний енергообмін;
- формування і зміцнення кісток і зубів;
- тонус і робота м'язів.

Також магній активізує засвоєння вітамінів групи В і вітаміну С, підтримує нормальний рівень кальцію.

Рекомендації щодо застосування

Дріжджі пивні ОСОКОР® з кальцієм і магнієм можуть бути рекомендовані як природний компонент для підвищення імунітету, нормалізації обміну речовин, збагачення харчового раціону кальцієм і магнієм.

Спосіб застосування

Дорослим і дітям старше 12 років по 2-3 таблетки 2-3 рази на день під час їжі.

Спосіб застосування та дози

Дорослим і дітям старше 12 років по 2-3 таблетки 2-3 рази на день під час їжі.

Застереження

Індивідуальна чутливість до компонентів продукту.

Не є лікарським засобом.