

Состав

1 г линимента содержит:

действующее вещество: сульфаниламид (стрептоцид) 50 мг;

вспомогательные вещества: рыбий жир очищенный для внешнего применения, бутилгидроксанизол (Е 320), эмульгатор № 1, полисорбат-80 или натрия карбоксиметилцеллюлоза очищенная, вода очищенная;

вспомогательные вещества, которые входят в состав эмульгатора №1: спирт цетиловый, спирт стеариловый.

Лекарственная форма

Линимент.

Основные физико-химические свойства: линимент белого с желтоватым или с желто-буроватым оттенком цвета, со специфическим запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Химиотерапевтические средства для местного применения. Сульфаниламиды. Код АТХ D06B A05.

Фармакодинамика

Препарат оказывает антимикробное влияние на стрептококки и другие микроорганизмы. Стрептоцид нарушает процесс ассимиляции микробной клеткой факторов ее роста – фолиевой, дигидрофолиевой кислот и других соединений, которые имеют в своем составе пара-аминобензойную кислоту (ПАБК). Благодаря схожести химической структуры ПАБК и сульфаниламида, последний как конкурентный антагонист кислоты включается в метаболизм микроорганизмов и нарушает его.

Фармакокинетика

Не изучалась.

Показания

Язвы, ожоги, трещины, раны, пиодермии, рожа кожи, гнойно-воспалительные процессы кожи, которые не сопровождаются выраженной экссудацией,

инфицированные раны в стадии регенерации.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата или к каким-либо другим сульфаниламидным средствам. Почечная недостаточность, острая порфирия. Беременность или период кормления грудью.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Во время применения Стрептоцида нежелательно принимать такие препараты как дигитоксин, кислоту хлористоводородную, кофеин, мезатон, фенobarбитал, адреналина гидрохлорид.

Новокаин, который содержит остаток парааминобензойной кислоты, снижает эффективность препарата, если эти лекарственные средства применялись сразу же один за другим.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Не применяют.

Способ применения и дозы

Линимент следует наносить тонким слоем на пораженный участок, в том числе под марлевую повязку. Кратность и продолжительность применения зависит от тяжести заболевания, достигнутого терапевтического эффекта и определяется врачом индивидуально.

Дети

Безопасность и эффективность применения Стрептоцида детям не установлены, поэтому не следует назначать препарат этой возрастной категории пациентов.

Передозировка

При передозировке возможно усиление побочного действия препарата.

Лечение: терапия симптоматическая.

Побочные реакции

При повышенной чувствительности к сульфаниламидным средствам возможны местные аллергические реакции (в том числе дерматиты, крапивница), развитие которых требует немедленной отмены препарата.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Не допускается замораживание.

Хранить в недоступном для детей месте.

После раскрытия тубы препарат хранить в течение курса лечения.

Упаковка

По 30 г в тубах, по 1 тубе в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

АО «Лубныфарм».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Україна, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Барвинкова, 16.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).