

Состав

действующие вещества: 1 фильтр-пакет (1,5 г) содержит смесь лекарственного растительного сырья: корней аира (*Calami radix*) 135 мг, алтея корней (*Althaeae radix*) 135 мг, липы цветков (*Tiliae flos*) 135 мг, ноготков цветков (*Calendulae flos*) 135 мг, солодки корней (*Liquiritiae radix*) 135 мг, шалфея листья (*Salviae officinalis folium*) 135 мг, бузины цветков (*Sambuci flos*) 120 мг, крапивы листья (*Urticae folium*) 120 мг, мяты перечной листьев (*Menthae piperitae folium*) 120 мг, тимьяна ползучего травы (*Serpylli herba*) 120 мг, девясила корней (*Inulae helenii radix*) 105 мг, ромашки цветков (*Matricariae flos*) 105 мг.

Лекарственная форма

Сбор.

Основные физико-химические свойства: смесь кусочков разной формы серовато-зеленого цвета с включениями оранжевого и желтого цвета разных оттенков. Запах сильный, приятный.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства. Код АТХ R05C A.

Фармакодинамика

Препарат БРОНХОФИТ имеет секретолитическое и секретокинетическое действия. Стимулирует серозные клетки желез слизистой оболочки бронхов, увеличивая содержание слизистого секрета, вследствие чего изменяется соотношение слизистого и серозного компонентов мокроты. Благодаря увеличению количества бронхиального секрета и уменьшению его вязкости облегчается отхаркивание мокроты. БРОНХОФИТ обладает противовоспалительными и общеукрепляющими свойствами.

Показания

Острые и хронические воспалительные заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем с образованием вязкой мокроты: острый и хронический бронхит, бронхоэктатическая болезнь, пневмония.

Противопоказания

Острая и хроническая почечная недостаточность, острая и хроническая печеночная недостаточность, цирроз печени, холестатичні расстройства, гипокалиемия, артериальная гипертензия III ст., круп; повышенная чувствительность к любым компонентам препарата или других растений семейства губоцвітних (Lamiaceae), а также известная аллергия на сельдерей и пыльцу березы (возможна перекрестная реакция).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Препарат не следует применять вместе с лекарственными средствами, угнетающими кашель, в связи с возможным скоплением мокроты в дыхательных путях. При длительном применении одновременно с сердцевинными гликозидами, адренокортикостероидами, антиаритмическими препаратами (хинидин), слабительными средствами, тиазидными и петлевыми диуретиками возможно нарушение водноэлектролитного баланса.

Особенности применения

Если в течение одной недели приема препарата симптоматика сохраняется или во время лечения отмечается ухудшение симптомов заболевания и/или появляются одышка, повышение температуры тела, гнойная мокрота, необходимо проконсультироваться с врачом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

В связи с отсутствием достаточного опыта применения препарата в период беременности его следует применять по назначению врача в случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для развития плода. При необходимости применения препарата следует прекратить кормление грудью.

Способ применения и дозы

2 фильтр-пакета залить 150 мл кипятка, настоять в закрытой посуде в течение 15 минут.

Взрослым и детям старше 7 лет принимать в теплом виде по 150 мл за 20-30 минут до еды 3 раза в сутки.

Длительность применения определяет врач. Обычно курс лечения составляет 3-4 недели.

Дети

Препарат противопоказан детям в возрасте до 7 лет.

Передозировка

Возможно возникновение отеков, диспептических симптомов, повышение артериального давления и усиление проявлений побочных реакций

Побочные реакции

Препарат обычно хорошо переносится пациентами. Однако, учитывая многокомпонентный состав препарата, в отдельных случаях, как правило, при индивидуальной гиперчувствительности к любому компоненту препарата или нарушении рекомендованного режима его приема возможно развитие аллергических реакций, в том числе гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи, контактный дерматит, крапивница; желудочно-кишечных расстройств, включая тошноту, рвоту, диарею. В случае появления любых негативных реакций необходимо обратиться к врачу.

Срок годности

2 года. Не применять после завершения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

2 года. Не применять после завершения срока годности, указанного на упаковке.

Упаковка

По 1,5 г в фильтр-пакете № 20.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «Научно-производственная фармацевтическая компания «ЭЙМ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 61091, Харьковская обл., г. Харьков, ул. Харьковских дивизий, 20 лит. «А-5».