

Состав

действующее вещество: сера;

1 г мази содержит серы для наружного применения 333 мг;

вспомогательные вещества: эмульсия консистентная: вода очищенная, парафин белый мягкий, эмульгатор «Т-2», масло минеральное.

Лекарственная форма

Мазь.

Основные физико-химические свойства: густая однородная масса желтоватого с зеленоватым оттенком цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Дерматологические средства. Препараты для лечения акне. Код АТХ D10A B02.

Фармакодинамика

При взаимодействии серы с органическими веществами образуются сульфиды и пентатионовая кислота, оказывающие антисептическое действие.

Фармакокинетика

При наружном применении Серной мази простой сера и парафин белый мягкий, входящие в ее состав, практически не абсорбируются в системное кровообращение.

Показания

Заболевания кожи: себорея, сикоз, микозы, псориаз. Лечение коросты (в составе комбинированной терапии).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При одновременном применении с препаратами для наружного применения могут образовываться новые соединения с непредусмотренным эффектом. Взаимодействие мази с окислителями (пероксидом водорода, калия перманганатом) может привести к химическому ожогу.

Особенности применения

Не допускать попадания мази на слизистые оболочки и в глаза. Руки после нанесения мази следует тщательно мыть.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Применение мази не влияет на способность управлять автомобилем или работать с другими механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Безопасность и клиническая эффективность применения препарата в период беременности или кормления грудью не изучались, поэтому применять мазь в этом период можно только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способ применения и дозы

Препарат применяют наружно.

Мазь наносят на пораженные участки кожи 2-3 раза в сутки. При лечении коросты схему применения препарата и требования личной гигиены определяют индивидуально. Длительность курса лечения зависит от достигнутого терапевтического эффекта и переносимости препарата.

Дети

Препарат противопоказан детям до 3 лет.

Детям от 3 до 12 лет применять препарат можно только по рекомендации врача с учетом соотношения польза/риск.

Передозировка

Не наблюдалось.

Побочные реакции

Аллергические реакции.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

25 г в банке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

АО «Лубныфарм».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Барвинкова, 16.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).