

Состав

действующее вещество: кислота салициловая;

1 г мази содержит салициловой кислоты 20 мг;

вспомогательные вещества: парафин белый мягкий.

Лекарственная форма

Мазь.

Основные физико-химические свойства: однородная мазь белого или светло-желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Дерматологические средства. Препараты салициловой кислоты.

Код АТХ D02AF.

Фармакодинамика

Салициловая кислота при местном применении проявляет слабое антисептическое, а также раздражающее, отвлекающее действие. Подавляет секрецию сальных и потовых желез. В низких концентрациях проявляет кератопластическое, а в высоких - кератолитическое действие.

Фармакокинетика

Салициловую мазь применять наружно, она практически не абсорбируется в системный кровоток и не проявляет резорбтивного действия.

Показания

Топической лечения гиперкератозов большой площади (например, псориаза).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к салициловой кислоты.

Особые меры безопасности. Не допускать попадания препарата в глаза, не наносить на слизистые оболочки.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При одновременном применении с препаратами для наружного применения могут создаваться новые соединения с непредсказуемым эффектом, что требует консультации с врачом.

Местное применение салициловой кислоты не следует сочетать с пероральным применением препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту и другие нестероидные противовоспалительные средства. Не применять вместе с бензоил-пероксидом и местными ретиноидами.

Салициловая кислота может повысить проницаемость кожи для других лекарственных средств для местного применения и тем самым увеличить их попадания в организм. Кроме того, салициловая кислота может усилить нежелательное действие метотрексата и гипогликемическое действие пероральных противодиабетических препаратов производных сульфонилмочевины.

Если пациент принимает любые другие лекарственные средства, следует обязательного сообщить об этом врачу.

Особенности применения

Не следует наносить препарат на большие участки кожи.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами не описан.

Применение в период беременности или кормления грудью

Безопасность и клиническая эффективность препарата в период беременности и кормления грудью не изучалась.

Способ применения и дозы

Перед наложением повязки с салициловой мазью раны освободить от некротических масс, промыть антисептическим раствором.

На пораженные места мазь накладывать 2-3 раза в сутки стерильной салфеткой или накладывать на раны стерильную повязку, пропитанную мазью.

При выраженном воспалении 2% мазь разбавлять вазелином в соотношении 1: 2 - 1: 4 раза и применять 1-2 раза в сутки; после устранения шелушения использовать другие средства.

Для лечения бородавок и мозолей применять 10% мазь.

Продолжительность курса лечения - от 6 до 20 суток.

Дети

Опыт применения у детей не описан.

Передозировка

Мазь предназначена только для наружного применения. При приеме внутрь возникают изжога и боль по ходу пищевода и в желудке, повторная рвота, может быть с примесью крови, иногда - жидкий стул с примесью крови. Больные возбуждены, в состоянии эйфории. Появляется головокружение, шум в ушах, ослабление слуха, нарушение зрения. Дыхание шумное, учащенное.

Лечение: промывание желудка через зонд, форсированный диурез, назначение значительного количества щелочной жидкости.

При применении больших доз препарата может усиливаться кератолитическим действием и аллергические реакции. В таком случае препарат необходимо смыть водой, обратиться за консультацией к врачу. Симптоматическая терапия.

Побочные реакции

Редко - местные реакции в виде зуда, жжения, кожных высыпаний, сухости, шелушения, раздражения, контактного дерматита, крапивницы.

При длительном применении возможно всасывание препарата в общий кровоток и развитие характерных для салицилатов побочных эффектов: шум в ушах, головокружение, боль в эпигастрии, тошнота, рвота, ацидоз, ускоренное дыхание.

В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° C; не допускается замораживание. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

Контейнеры по 25 г.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО Фармацевтическая фабрика «Виола».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

69063, Украина, г. Запорожье, ул. Академика Амосова, 75.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).