

Состав

действующее вещество: apilacum;

1 г мази содержит 10 мг апилака лиофилизированного;

вспомогательные вещества: парафин белый мягкий, спирт цетиловый, глицерин, парафин, натрия цетостеарилсульфат, спирт циннамиловый, метилпарабен (Е 218), вода очищенная.

Лекарственная форма

Мазь.

Основные физико-химические свойства: мазь белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета со специфическим запахом спирта циннамилового (гиацинта).

Фармакотерапевтическая группа

Дерматологические средства.

Код АТХ D11A X.

Фармакодинамика

Действующим веществом мази является апилак – пчелиное маточное молочко.

Пчелиное маточное молочко – это секрет, который вырабатывается аллотрофическими железами рабочих пчел и является биологическим стимулятором с тонизирующим, трофическим и антиспастическим действием. Препарат стимулирует клеточный метаболизм и регенеративные процессы, улучшает трофику тканей.

Показания

В комплексном лечении себореи, себорейной и микробной экземы, нейродермита, опрелостей.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к продуктам пчеловодства или к другим вспомогательным веществам, входящим в состав препарата;

- болезнь Аддисона.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестно.

Особенности применения

Препарат может вызывать аллергические реакции.

Из-за возможности развития аллергических реакций и обострения заболевания необходимо в первый раз наносить мазь на ограниченные участки неповрежденной кожи для установления индивидуальной чувствительности. При отсутствии нежелательных реакций можно наносить мазь на всю поврежденную кожу.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Неизвестна.

Применение в период беременности или кормления грудью

Отсутствуют клинические данные о негативном влиянии пчелиного маточного молочка лиофилизированного в период беременности или кормления грудью.

Способ применения и дозы

Мазь следует наносить тонким слоем на поврежденную поверхность 1-2 раза в сутки в количестве 2-10 г (под повязку или непосредственно на поврежденный участок кожи). Длительность курса лечения составляет от 1 недели до 2 месяцев.

Дети

Препарат можно применять детям с 2-х лет.

Передозировка

Возможно усиление проявлений побочных реакций. В случае передозировки лечение следует прекратить. Терапия симптоматическая.

Побочные реакции

В зависимости от индивидуальной чувствительности и дозировки, особенно в начале терапии, возможны такие побочные эффекты: кожные аллергические реакции (сыпь, зуд, воспаления), которые проходят после прекращения приема препарата.

При возникновении нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и проконсультироваться с врачом о дальнейшей терапии.

Срок годности

2 года.

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 50 г в тубах алюминиевых; по 1 тубе в картонной пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

АО Таллиннский фармацевтический завод.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Тонди 33, 11316 Таллинн, Эстония.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).