

Властивості

Кардіоневрин – джерело полікозанолу та омега-3 жирних кислот, які сприяють нормалізації рівня загального холестерину, ЛПНЩ (ліпопротеїдів низької щільності) та ЛПДНЩ (ліпопротеїдів дуже низької щільності) в сироватці крові та функціонуванню серцево-судинної системи, стану судин серця та головного мозку.

Омега-3 жирні кислоти, які використані в продукті Кардіоневрин є рослинними та отримані шляхом переробки морських водоростей і тому можуть використовуватися для збагачення раціонів вегетаріанців, та для людей, які мають алергічні реакції і непереносимість морепродуктів тваринного походження.

Полікозанол – натуральна речовина, виділена з цукрової тростини. Дія полікозанолу базується на пригніченні синтезу холестерину в клітинах печінки і прискоренні розпаду «особливо небезпечних» ліпопротеїдів низької щільності, з підвищеним рівнем яких безпосередньо пов'язаний ризик розвитку атеросклерозу.

Полікозанол у складі Кардіоневрину, забезпечує профілактику тромбозу з тією ж ефективністю, що і малі дози антитромботичних лікарських засобів. Регулярне вживання продукту «Кардіоневрин» може сприяти зменшенню розвитку вікових та атеросклеротичних змін у судинах, та регресу існуючих атеросклеротичних бляшок. Може застосовуватися на тлі терапії препаратами для зниження рівня холестерину. Добавки дієтичні не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Склад

Полікозанол – 10 мг з екстракту цукрової тростини, омега-3 жирні кислоти (DHA 10%) – 400 мг; допоміжна речовина: крохмаль.

Харчова (поживна) цінність рекомендованої добової дози: білки – 0 г (г); жири – 0,22 г (г); вуглеводи – 0,02 г (г). **Енергетична цінність (калорійність) рекомендованої добової дози:** 2,06 kcal(ккал).

Спосіб застосування та дози

Дорослим по 1 капсулі двічі на добу протягом 1 місяця. Термін вживання та дози може бути змінено.

При станах після гострого порушення коронарного чи мозкового кровотоку (ГІМ, нестабільна стенокардія, стентування будь-якої локалізації, після гострого ішемічного інсульту або транзиторних ішемічних атак) за призначенням лікаря можна вживати по 1 капсулі 4 рази на добу. Оптимальний термін вживання 3 місяці.

Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність, період лактації, діти до 18 років.

Умови зберігання

Зберігати в упаковці виробника за температури від 1 °С до 25 °С та відносній вологості повітря не вище за 75%, строк придатності – 3 роки з дати виготовлення. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Форма випуску

Капсули по 420 мг по 12 штук у блістерах, блістери по 5 штук у картонних коробках.