

Состав

действующее вещество: настойка эвкалипта прутовидного листьев;

1 флакон 70% 25 мл содержит настойки эвкалипта прутовидного листьев (*Eucalypti viminalis folia*) (1: 5) (экстрагент - этанол).

Лекарственная форма

Настойка.

Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость зеленовато-бурого цвета со специфическим запахом допускается образование осадка при хранении.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для применения в стоматологии. Код АТХ А01А D11.

Фармакодинамика

"Эвкалипта настойка" содержит комплекс биологически активных веществ: дубильные вещества, элаговую кислоту, флавоноиды, смолы, воск, эфирное масло, в состав которой входят различные терпеновые соединения (в том числе цинеолмоноциклический терпен), которые пагубно влияют на грамположительные, грамотрицательные микроорганизмы, грибы и простейшие. Препарат подавляет рост золотистого стафилококка, эшерихий, туберкулезных микобактерий, трихомонад, дизентерийной амебы, оказывает антисептическое, противовоспалительное, дезинфицирующее, умеренное седативное (успокаивающее) действие.

Фармакокинетика

Не определялась.

Показания

Воспалительные заболевания верхних дыхательных путей, носоглотки и ротовой полости (трахеит, ларингит, фарингит, гингивит, стоматит), повреждения кожи (в том числе инфицированные раны), а также легкие формы невротических расстройств (раздражительность, эмоциональная лабильность, нарушение засыпания и сна).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Бронхиальная астма, бронхоспазм. Воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и желчевыводящих путей. Заболевания печени тяжелого течения.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не известна.

Особенности применения

Поскольку в состав препарата входит этанол, настойку не рекомендуется принимать в течение длительного времени.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Поскольку в составе препарата содержится этанол, не рекомендуется применять "Эвкалипта настойку" при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Поскольку в состав препарата входит этанол, настойку не рекомендуется принимать внутрь женщинам в период беременности или кормления грудью.

Способ применения и дозы

"Эвкалипта настойку" принимают внутрь, а также для полоскания и паровых ингаляций.

Взрослым рекомендуется принимать внутрь по 15-30 капель настойки 3-4 раза в день после еды детям старше 12 лет - из расчета 1 капля на 1 год жизни 3-4 раза в день после еды.

Для полоскания развести 10-15 капель настойки в 200 мл теплой кипяченой воды.

Паровые ингаляции проводить с помощью ингаляторов любого типа, применяя препарат в неразбавленном виде или после предварительного разведения его водой (как для полоскания).

Продолжительность лечения зависит от достигнутого терапевтического эффекта, определяется врачом.

Дети

Препарат применяют детям старше 12 лет по назначению и под наблюдением врача.

Передозировка

Не установлено.

Побочные реакции

При повышенной чувствительности к препарату могут возникнуть аллергические реакции (в т. ч. крапивница, покраснение и сыпь на коже, зуд, отек Квинке), иногда - контактный дерматит (в области губ) тошнота, рвота и диарея. При выраженных реакциях применение препарата необходимо прекратить.

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 ° С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 25 мл во флаконе.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «ГКП» Фармацевтическая фабрика ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 12430, Житомирская обл., Житомирский р-н, с. Станишевка, ул. Королева, д. 4.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).