

## **Состав**

*действующее вещество:* benzyl benzoate;

1 г мази содержит бензилбензоата медицинского 250 мг;

*вспомогательные вещества:* цетилпиридиния хлорид, пропиленгликоль, спирт цетостеариловый, вода очищенная.

## **Лекарственная форма**

Мазь.

*Основные физико-химические свойства:* мазь белого цвета со специфическим запахом. По внешнему виду должна быть однородной.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Средства, действующие на эктопаразитов, включая клещей чесотки. Код АТХ R03A X01.

## **Фармакодинамика**

Мазь Бензилбензоат-Дарница оказывает акарицидное действие на различные виды клещей, включая чесоточных клещей (*Acanis scabiei*) и клещей рода *Demodex*, имеет противопедикулезную активность. Лекарственное средство оказывает бактериостатическое действие благодаря наличию антимикробного консерванта - цетилпиридиния хлорида.

Оказывает токсическое действие на все виды вшей (гибель вшей наступает через 2-5 часов, клещей - через 7-32 минуты). Проникает через хитиновый покров и накапливается в организме клеща в токсических концентрациях. Вызывает гибель личинок и взрослых особей чесоточных клещей; не действует на яйца.

## **Фармакокинетика**

При местном применении бензилбензоат в системный кровоток практически не попадает.

## **Показания**

Лечение чесотки, педикулеза.

## **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к бензилбензоату или другим компонентам препарата. Повреждения кожи, в том числе гнойничковые заболевания кожи.

## **Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий**

Фармакологического взаимодействия мази Бензилбензоат-Дарница с другими лекарственными средствами не выявлено, однако, как и все противопаразитарные средства, это лекарственное средство не рекомендуется применять одновременно с другими препаратами для наружного применения. Местное или системное применение кортикостероидов может способствовать исчезновению или уменьшению проявления некоторых симптомов (зуда, гиперемии) при сохранении инвазии, поэтому на период лечения мазью Бензилбензоат-Дарница следует избегать применения таких лекарственных средств.

Цетилпиридиния хлорид, входящий в состав лекарственного средства в качестве антимикробного консерванта и эмульгатор, взаимодействует с анионными поверхностно-активными веществами, в частности с мылом. Это может приводить к потере бактериостатических свойств лекарственного средства и его коагуляции.

## **Особенности применения**

Перед началом лечения больному целесообразно принять горячий душ для механического удаления с поверхности кожи клещей, а также для разрыхления поверхностного слоя эпидермиса (для облегчения проникновения лекарственного средства). После каждого вынужденного мытья рук их снова необходимо обработать. Обязательно следует проводить обработку нательного и постельного белья, верхней одежды и головных уборов.

Следует избегать попадания мази в глаза и на слизистые оболочки. При случайном попадании лекарственного средства:

- в глаза: тщательно промыть водой или 1% раствором натрия гидрокарбоната, при раздражении слизистой оболочки глаз закапывать 30% раствором альбумида, при боли 2% раствором новокаина;
- в рот: рот прополоскать водой или теплым 2% раствором натрия гидрокарбоната;
- в желудок: при случайном приеме лекарственного средства внутрь следует немедленно обратиться к врачу.

После завершения курса лечения необходим контроль врача в течение 2 недель (а при наличии осложнений и более).

Обработка больных в одном очаге, а также контактных лиц следует проводить одновременно.

Осложнения в виде пиодермий, экземы следует лечить одновременно с чесоткой и продолжать после ее ликвидации.

*Важная информация о вспомогательные вещества.*

Лекарственное средство содержит пропиленгликоль, что может вызвать раздражение кожи.

Лекарственное средство содержит спирт цетостеариловый, что может привести местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

### **Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами**

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать со сложными механизмами.

### **Применение в период беременности или кормления грудью**

Данные о применении лекарственного средства в период беременности отсутствуют, в связи с чем не рекомендуется применять этой категории пациентов.

На период лечения кормление грудью следует прекратить.

### **Способ применения и дозы**

Мазь Бензилбензоат-Дарница применять местно. За одно применение наносится 10-15 г мази. У детей мазью покрывать все участки кожи, взрослым наносить на все участки кожи, кроме лица и волосистой части головы. При лечении чесотки перед применением лекарственного средства пациентам следует принять горячий душ с мылом для удаления чешуек и корочек, тщательно смыть мыло и вытереться полотенцем. Сначала мазь наносить на ладони, кисти рук, затем - на все остальные части тела последовательно сверху вниз (мазь не следует наносить на лицо и слизистые оболочки). В последнюю очередь мазь наносить на ноги, ступни и в межпальцевые промежутки. В местах с нежной кожей (паховая участок, гениталии, грудные железы), а также при экземе, дерматите или пиодермии следует осторожно наносить мазь, втирать.

После обработки руки не следует мыть в течение 3 часов. В некоторых случаях после высыхания нанесенного мази (обычно через 1:00) рекомендуется нанести второй слой лекарственного средства. После окончания обработки больным следует надевать чистую нательное белье, одежду, изменить постель. Через 24-48 часов больным принять душ и снова поменять белье и постельные принадлежности.

Мазь наносить на кожу 4 раза в течение 2 недель с интервалом 3-4 дня. На курс лечения расходуется в среднем 60-90 г мази.

При лечении чесотки у детей в возрасте от 3 до 5 лет мазь Бензилбензоат-Дарница непосредственно перед применением необходимо разбавить теплой кипяченой водой (30-35 ° С) в соотношении 1: 1 и перемешать до образования однородной эмульсии. Обработку, как правило, следует проводить без предварительной теплой ванны 2 раза с интервалом 12:00.

При лечении «норвежской чесотки» перед применением мази Бензилбензоат-Дарница необходимо предварительно с помощью кератолитических средств (например, крема Карбодерм-Дарница®, содержащий 10% мочевины) очистить кожные покровы от корок. Продолжительность курса лечения определяется динамикой очищения кожных покровов, купирование воспалительного процесса, прекращением зуда.

При лечении педикулеза препарат наносить на волосы и волосистую часть головы, слегка втирая в кожу; голову связывать платком. Через 30 минут лекарственное средство смыть проточной водой и ополоснуть волосы теплым 5% раствором уксуса. После окончания описанной процедуры волосы помыть с мылом или шампунем и расчесать частым гребнем для удаления гнид. При лобковом педикулезе мазь втирать в кожу лобка, живота, паховых складок и внутренних поверхностей бедер. Эффективность обработки определять через сутки и при необходимости процедуру повторить.

## **Дети**

Детям до 3 лет не рекомендуется применять препарат.

## **Передозировка**

### *Симптомы.*

При передозировке возможно усиление проявлений побочных эффектов, например контактного дерматита.

При случайном проглатывании мази или нанесении слишком большого количества возможны: усиление побочных эффектов лекарственного средства, контактный дерматит, внезапная потеря сознания, стимуляция центральной нервной системы (судороги) и задержка мочеиспускания.

*Лечение симптоматическое.* Кожу необходимо очистить от мази. В случае появления любой нежелательной реакции на месте нанесения лекарственного средства его необходимо смыть водой с мылом.

При проглатывании мази необходимо промыть желудок, а затем принять активированный уголь. При необходимости применить противосудорожные средства.

### **Побочные реакции**

При аппликациях лекарственного средства может возникнуть ощущение пощипывания, жжения, исчезает при дальнейшем применении мази. В редких случаях у лиц с чувствительной кожей могут возникнуть местные кожные реакции (жжение или зуд, покраснение или сухость участка кожи, обрабатывается лекарственным средством), а также аллергические реакции, включая сыпь, отек. Если вышеуказанные побочные эффекты в дальнейшем не исчезают самостоятельно, применение препарата необходимо прекратить. Чувствительность кожи особенно повышалась на поврежденных участках и гениталиях. Иногда может возникнуть контактный дерматит.

### *Сообщение о подозреваемых побочных реакции.*

Сообщение о подозреваемых побочных реакции после регистрации лекарственного средства является важной процедурой. Это позволяет продолжать мониторинг соотношения «польза / риск» для соответствующего лекарственного средства. Медицинским работникам необходимо сообщать о любых подозреваемых побочных реакции через национальную систему сообщений.

### **Срок годности**

2 года.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С. Не замораживать.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Упаковка**

По 30 г в тубе, по 1 тубе в пачке.

### **Категория отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

ЗАО «Фармацевтическая фирма» Дарница ».

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 02093, г.. Киев, ул. Бориспольская, 13.

### **Источник инструкции**

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).