

## **Состав**

Перметрин - 0,5 - 1,5 (действующее вещество); изопар - 6,0; парафин белый мягкий -1,0; дегикварт SP - 5,0; амфисол - 4,0; спирт цетиловый - 2,5; глицерин - 2,0; нипагуард - 0,8; отдушка; вода очищенная - до 100.

## **Лекарственная форма**

Лосьон противопедикулезный «ПерМин» представляет собой густую эмульсию без посторонних примесей белого или белого с кремовым оттенком цвета с запахом использованной отдушки.

## **Фармакодинамика**

Лосьон противопедикулезный «ПерМин» проявляет инсектицидную и овоцидную активность относительно головных вшей.

## **Показания**

Лосьон противопедикулезный «ПерМин» предназначен для уничтожения головных вшей (имаго, личинки, яйца) населением в бытовых условиях.

## **Противопоказания**

Лосьон не подлежит использованию для обработки волос детям до 3 лет, беременным, в период кормления грудью, лицам с повреждением кожи головы (царапины, раны, раздражения на пораженных педикулезом участках тела), а также лицам, проявляющим повышенную чувствительность к лосьону или склонным к аллергическим заболеваниям.

## **Особенности применения**

Меры предостережения при использовании: лосьон используют только наружно. Обработку волос детей проводят взрослые. Обработку волос проводят вдали от источников открытого огня и тепла. Во время обработки волос необходимо придерживаться требований личной безопасности, направленных на предотвращения попадания лосьона на открытые участки кожи и на слизистую оболочку глаз и верхних дыхательных путей. Запрещается принимать пищу, напитки и курить во время проведения работ по обработке волос лосьоном. После нанесения лосьона на волосы необходимо вымыть лицо и руки водой с мылом. В случае появления симптомов плохого самочувствия необходимо

немедленно прекратить обработку лица, пораженного педикулезом, вывести потерпевшее лицо на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение, обеспечить покой, тепло, освободить от тесной одежды. При случайном попадании лосьона в глаза необходимо промыть глаза проточной водой в течение 10-15 мин. В случае случайного попадания лосьона на открытые участки кожи необходимо промыть загрязненный участок кожи проточной водой. При попадании лосьона на одежду необходимо снять ее, а участок кожи под одеждой промыть водой. В случае случайного проглатывания лосьона необходимо немедленно выпить несколько стаканов воды, содержащей 10-15 измельченных таблеток активированного угля, а потом путем раздражения задней стенки глотки вызвать рвоту. После промывания желудка необходимо обратиться к врачу.

### **Способ применения и дозы**

Перед использованием лосьона волосы моют при помощи обычного шампуня и просушивают полотенцем. На высушенные волосы равномерно наносят лосьон при помощи ватного, марлевого тампонов, спонжа или губки, тщательно втирая в корни волос (особенно за ушами и на затылке). Норма расходов лосьона составляет 30-50 г на одну обработку (в зависимости от длины и густоты волос). С целью предотвращения попадания лосьона на слизистую оболочку глаз, носа и ротовой полости используют жгут из хлопковой ткани, который обвязывают вокруг головы по границе волосистой части. Через 10 мин лосьон смывают проточной теплой водой в течение 2- 3 мин, потом моют с использованием шампуня или мыла. Волосы тщательно расчесывают при помощи гребня с целью удаления погибших насекомых и гнид (яиц). Повторную обработку проводят по показаниям, но не ранее чем через 7 суток. Перед использованием лосьона необходимо хорошо взболтать упаковку.

### **Срок годности**

3 года.