

Состав

Активные компоненты:

- Метилсульфонилметан - 2500 мг.
- Коллаген - 1000 мг.
- L-аргинин - 1000 мг.
- L-лизин - 500 мг.
- Витамин С - 500 мг.
- Глюкозамин - 150 мг.
- Хондроитину сульфат - 150 мг.
- Босвелии сухой экстракт - 100 мг.
- Куркумы сухой экстракт - 100 мг.
- Мирры сухой экстракт - 100 мг.

Вспомогательные вещества: загустители: подкислитель: лимонная кислота ароматизатор, идентичный натуральному; подсластители: сукралоза, фруктоза; антиадгезивная агент: диоксид кремния.

Без ГМО. Не содержит глютена и лактозы.

Описание

Тендисульфур Форте - это действенная комбинация комплекса натуральных веществ, аминокислот и хондропротекторов, обладающих противовоспалительным, трофическую и обезболивающее действие и способствуют восстановлению сухожилий и суставов при воспалительных и дегенеративных процессах.

Показания

Тендисульфур Форте может быть рекомендован как дополнительный источник биологически активных веществ, в частности серы, экстрактов лекарственных растений, коллагена и других. Способствует

нормализации функционирования опорно-двигательного аппарата, профилактике воспалительных процессов в сухожилиях и суставах, в том числе позвоночника, которые могут сопровождаться болевыми ощущениями во время движений.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1 саше в день, или в другой дозе по рекомендации врача.

Содержание саше растворить в большом стакане воды, перемешать до получения однородного раствора и немедленно выпить. Рекомендуется принимать Тендисульфур Форте преимущественно на полный желудок, после основного питания. Наличие нерастворенных частиц не является признаком изменения продукта, а объясняется экстрактами растений, содержащий продукт.

Длительность применения - 2 недели. Увеличение срока употребления рекомендуется согласовывать с врачом.

Предостережение

Содержит подсластитель. Не превышать указанную рекомендованное количество для ежедневного потребления. Не следует использовать в качестве замены полноценного рациона питания. При любом ощущении дискомфорта после употребления продукта следует немедленно прекратить его употребление и обратиться к врачу. Перед применением рекомендуется консультация врача.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью.