

Опис

Функціональне дитяче харчування: **Інфатріні Пептісорб / Infatrini Peptisorb** для дітей від народження до 18 місяців або масою тіла до 9 кг.

- Суміш рідка, повноцінна.
- Глибокий гідроліз сироваткового білка (2,6 г / 100 мл) - легко засвоюється для забезпечення підвищених потреб.
- Високоенергетична суміш. В 1 мл – 1 ккал (майже на 50% більше, ніж у стандартній дитячій суміші¹).
- «Наднизький» вміст лактози (<0,10 г / 100 мл) - полегшує травлення, знижує газоутворення в кишківнику та коліки у випадку наявності лактазної недостатності.
- Містить нуклеотиди – 3,6 мг/100 мл, -, що може позитивно впливати на становлення імунної відповіді у новонароджених, всмоктування заліза а також покращувати показники росту і розвитку².
- Середньоланцюгові тригліцериди складають 52% жирів (2,8 г на 100 мл), що забезпечує легке засвоєння³.
- Готова до вживання рідка суміш для зручності і безпеки використання – підходить для годування з пляшечки або через зонд.
- Може застосовуватись як єдине джерело харчування для дітей від народження до 18 місяців або з масою тіла до 9 кг.
- Запаковано в захисному середовищі. Ультрапастеризований продукт.

1. В порівнянні зі звичайно рекомендованою сумішшю для здорових дітей : Суміш молочна Nutrilon, енергетична цінність якої 6,6 ккал в 1 мл готової суміші.

2. Carver J. D., Walker W. A. The role of nucleotides in human nutrition. Nutr. Biochem. 1995; 6: 58-72.

3. Няньковський С.Л., Івахненко О.С., Яцула М.С., Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Синдром мальабсорбції з позицій сучасного педіатра-клініциста // На допомогу педіатру. – 2012. - № 6 (41). – С. 134-140.

4. О.Г. Шадрін, В.П. Місник, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України», м. Київ. Актуальні питання штучного вигодовування немовлят. // Дитячий лікар. – 2010. - №3 (5). – С. 13-17.

Склад

Демінералізована вода, глюкозний сироп, мальтодекстрин, рослинні олії (середньоланцюгові тригліцериди (з кокосової та/або пальмової олії), кукурудзяна, рапсова, соняшникова), гідролізований білок з сироватки (з коров'ячого **молока**), емульгатор (лимоннокислі ефіри моно- та дигліцеридів жирних кислот), гідроортофосфат калію, **риб'ячий** жир, хлорид кальцію, регулятор кислотності (лимонна кислота), фосфат кальцію, гідроксид калію, гідроксид кальцію, рослинна олія з *Mortierella alpina*, хлорид холіну, L-аскорбат натрію, інозитол, гідроортофосфат магнію, L-гістидин, таурин, L-тирозин, лактат заліза(II), гідроксид натрію, ацетат DL-альфа токоферолу, сульфат цинку, L-карнітин, цитидин-5'-монофосфат, L-аргінін, аденозин-5'-монофосфат, D-пантотенат кальцію, натрієва сіль уридин-5'-монофосфату, натрієва сіль інозин-5'-монофосфату, нікотинамід, глюконат міді, натрієва сіль гуанозин-5'-монофосфату, гідрохлорид тіаміну, рибофлавін, ретинілацетат, гідрохлорид піридоксину, йодид калію, сульфат марганцю(II), фолієва кислота, хлорид хрому(III), фітоменадіон, D-біотин, холекальциферол, селеніт натрію, ціанокобаламін. Без ГМО. Без глютену.

Поживна цінність		на 100 мл
Енергетична цінність	кДж / ккал	418/100
Жири , з них:	г	5,4
насичені	г	3,8
Середньоланцюгові тригліцериди	г	2,8
мононенасичені	г	0,77
поліненасичені	г	0,86
Арахідонова кислота (АК)	мг	25,2
Докозагексаєнова кислота (ДГК)	мг	25,0
Вуглеводи , з них:	г	10,2

цукри	г	2,7
лактоза	г	<0,10
Харчові волокна	г	0
Білки	г	2,6
Сіль	г	0,09
Вітаміни		
Вітамін А	мкг RE	88,0
Вітамін D	мкг	2,4
Вітамін Е	мг α-TE	2,1
Альфа-токоферол	мг	2,7
Вітамін К	мкг	6,7
Тіамін	мг	0,15
Рибофлавін	мг	0,20
Ніацин (преформований)	мг	0,80
Ніацин (включаючи триптофан)	мг NE	1,67
Пантотенова кислота	мг	0,80

Вітамін В6	мг	0,11
Фолієва кислота	мкг	16,0
Фолати	мкг	26,7
Вітамін В12	мкг	0,30
Біотин	мкг	4,0
Вітамін С	мг	14,0
Мінеральні речовини		
Натрій	мг	37,0
Калій	мг	111,0
Хлориди	мг	75,0
Кальцій	мг	90,0
Фосфор	мг	45,0
Магній	мг	9,0
Залізо	мг	1,2
Цинк	мг	0,80
Мідь	мг	0,075

Марганець	мг	0,006
Молібден	мкг	6,0
Селен	мкг	3,75
Хром	мкг	4,0
Йод	мкг	19,0
Інші		
L-карнітин	мг	2,0
Холін	мг	32,1
Інозитол	мг	25,0
Таурин	мг	7,0
Нуклеотиди	мг	3,6
Осмолярність	мОсмоль/л	295

Рекомендації щодо застосування

Для дітей від народження до 18 місяців або з масою тіла до 9 kg (кг) з затримкою фізичного розвитку, підвищеними енергетичними потребами та/або з обмеженнями споживання рідини, з харчовою непереносимістю та з харчовою алергією

Ці стани можуть зустрічатися при

- наявності дефіциту ферментів підшлункової залози, який може спостерігатися при хронічному панкреатиті, раку підшлункової залози,

муковісцидозі або після обширних резекцій підшлункової залози- запальних захворювання кишечника

- синдромі короткої кишки
- променевому ентериті, під час хіміотерапії та при трансплантації кісткового мозку
- розладах шлунково-кишкового тракту, пов'язаних із ВІЛ
- хронічних захворюваннях печінки
- інших порушеннях шлунково-кишкового тракту, спричинених критичними станами, оперативними втручаннями, неврологічними розладами

Використовується для перорального прийому або введення через зонд.

Дозування розраховується залежно від вікових потреб дитини в енергії та білку. Дозування має визначатися лише лікарем.

Спосіб застосування

- Вимийте руки, використовуйте чистий або стерилізований посуд.
- Перед застосуванням добре збовтати.
- Перелийте суміш у стерилізовану пляшечку для годування або в контейнер для годування через зонд.
- Застосовувати суміш кімнатної температури або підігріти до +37 °С.
- Не використовуйте мікрохвильову піч для розігріву.
- Завжди перевіряйте температуру суміші перед застосуванням.

Застереження щодо гігієни ротової порожнини: Тривалий або частий контакт напоїв та їжі із зубами збільшує ризик карієсу, тому якісна гігієна ротової порожнини важлива для немовлят та дітей. Слідкуйте за першими зубками малюка, особливо перед сном. При необхідності проконсультуйтеся з Вашим лікарем або стоматологом.

Застереження

Застосовувати тільки під наглядом лікаря, після повного розгляду всіх варіантів годування, включаючи грудне вигодовування. Тільки для ентерального застосування! Не застосовувати парентерально! Може застосовуватись як єдине джерело харчування для дітей від народження до 18 місяців або з масою тіла до 9 кг. Не є лікарським засобом.

Форма випуску

Рідка суміш у пластиковій пляшечці об'ємом 200 мл □.

Умови зберігання

Зберігати у сухому і прохолодному місці (від +5 до +25 °C) та відносній вологості не більше ніж 75%. Після першого відкриття закрити пляшечку та зберігати в холодильнику не більше 24 годин, за умови що продукт не споживали безпосередньо із пляшечки.

Термін придатності

9 місяців.

Виробник

Виробник: «Н.В. Нутриція», Нідерланди, Еерсте Стаціонсстраат 186, 2712 НМ Зутермер / "N.V. Nutricia", Eerste Stationsstraat 186, 2712 НМ Zoetermeer, The Netherlands

Імпортёр: ТОВ з іноземними інвестиціями "Нутриція Україна", Україна, 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 18/14, корпус 2.