

Склад

На 1 таблетку масою по 756 мг (mg) $\pm$ 10 %: DL-метіонін - 50 мг (mg); ніацин (у вигляді нікотинамід) - 36 мг (mg); вітамін E (у вигляді DL-альфа-токоферилацетату) - 30 мг (mg); ресвератрол - 30 мг (mg); цинк (у складі цинку оксиду) - 12 мг (mg); рутин (у вигляді рутозиду тригідрату) - 10 мг (mg); убідекаренон (коензим Q 10) - 10 мг (mg); кальцію D - пантотенат - 8 мг (mg); вітамін B2 (рибофлавін) - 3 мг (mg); вітамін B1 (у вигляді тіаміну гідрохлориду) - 2,6 мг (mg); вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) - 2 мг (mg); мідь (у складі міді сульфату) - 1000 мкг (pg); вітамін A (у вигляді ретинілацетату) - 750 мкг (M-g); фолієва кислота - 200 мкг (pg); йод (у складі калію йодиду) - 150 мкг (pg); біотин - 100 мкг (pg); селен (у складі натрію селенату) - 50 мкг (pg); вітамін B12 (ціанокобаламін) - 3 мкг (pg); целюлоза мікрокристалічна; суміш для плівкового покриття Opadry II White або Nutrafmish White; натрію кроскармелоза; суміш для плівкового покриття Opadry II Pink або Nutrafinish Pink; магнію стеарат; гіпромелоза; кремнію діоксид колоїдний безводний; віск карнаубський; аскорбінова кислота.

Рекомендації щодо застосування

Як дієтична добавка до раціону харчування, додаткове джерело вітамінів групи B, ресвератролу, антиоксидантів, які сприяють загальнозміцнюючій дії, підтримують серцево-судинну та нервову систему.

Спосіб застосування та дози

Дорослим по 1 таблетці на добу під час або після вживання їжі.

Тривалість курсу - 1-2 місяці. Перед вживанням рекомендована консультація з лікарем. Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання.

Застереження

Індивідуальна чутливість до компонентів продукту.

Не вживати після закінчення строку придатності.

Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Умови зберігання

За температури не вище 25 °С і відносній вологості повітря не вище 65 %.
Зберігати в недоступному для дітей місці.

Виробник

АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», 04073, Україна, м. Київ, вул.
Копилівська, 38