

Склад

1 желатинова капсула містить: докозагексаєнова кислота (ДГК) – 200 мг; ейкозапентаєнова кислота (ЕПК) – 40 мг; вітамін А - 4000 МО; вітамін Д3 – 400 МО; вітамін Е - 30 МО;

1 тверда капсула містить: кальцій – 120 мг; біотин (вітамін В7) – 100 мкг; ніацин (вітамін РР) – 17 мг; фолієва кислота – 400 мкг; пантотенова кислота (вітамін В5) – 10 мг; вітамін В1 – 1,7 мг; вітамін В2 – 1,6 мг; вітамін С – 60 мг; цинк – 15 мг; вітамін В12 – 2,0 мкг; залізо – 20 мг; вітамін В6 – 2,0 мг; селен – 35 мкг; лютеїн – 250 мкг; йод – 150 мкг.

Опис

Вітаміно-мінеральний комплекс для жінок у період годування груддю з метою профілактики дефіциту вітамінів, мінералів та поліненасичених жирних кислот у мами після пологів та новонародженого шляхом збагачення грудного молока.

Властивості

Поліненасичені жирні кислоти Омега-3 (ДГК та ЕПК) необхідні для здорового розвитку мозку, пізнавальних та розумових функцій зору дитини.

Вітамін С та цинк сприяють підтримці імунітету.

Вітаміни групи В беруть участь у природному утворенні енергії в організмі.

Вітамін Д сприяє засвоєнню кальцію, необхідного для здорового розвитку кісткової системи дитини.

Йод необхідний нормального функціонування щитовидної залози, сприяє формуванню інтелекту дитини.

Залізо забезпечує нормальний обмін речовин матері та дитини.

Вітамін А та лютеїн забезпечують процеси зору.

Вітамін Е та селен покращують споживання тканинами кисню, надають імуномодельючий ефект.

Кальцій відповідає за формування скелета, регулює обмінні процеси.

Рекомендації щодо застосування

Може бути рекомендований лікарем для жінок у період годування груддю з метою профілактики дефіциту вітамінів, мінералів та поліненасичених жирних кислот у мами після пологів та новонародженого через збагачення грудного молока.

Спосіб застосування

Вживати перорально по 1 желатиновій капсулі та 1 твердій капсулі на добу після їди, запиваючи невеликою кількістю води. Курс та термін вживання визначає лікар індивідуально. Не слід перевищувати рекомендовану дозу.

При одночасному застосуванні будь-яких лікарських засобів рекомендується консультація лікаря.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Не є лікарським засобом. Без ГМО.

Умови зберігання

Зберігати у сухому, захищеному від світла місці, недоступному для дітей, при температурі від 15 °C до 25 °C.