

Склад

діюча речовина: камфора рацемічна;

100 мл розчину містять камфори рацемічної 10 г;

допоміжна речовина: етанол 70 %.

Лікарська форма

Розчин для зовнішнього застосування, спиртовий.

Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна рідина із специфічним запахом камфори.

Фармакотерапевтична група

Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому та м'язовому болю.

Код АТХ М02А Х10.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Лікарський засіб чинить протимікробну, знеболювальну, протизапальну, подразнювальну дію.

Показання

Зовнішньо — при запальних процесах (артрит, міозит, артралгія, міалгія, ішіас), для запобігання пролежням.

Протипоказання

Підвищена індивідуальна чутливість. Виразково-некротичні захворювання шкіри, схильність до судомних реакцій.

Особливі заходи безпеки

Не допускати потрапляння розчину в очі.

Не допускати потрапляння препарату на слизові оболонки. При випадковому потрапленні слід змити препарат великою кількістю проточної води.

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу — це може зашкодити здоров'ю.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

Не виявлена.

Особливості щодо застосування

Застосування у період вагітності або годування груддю.

У період вагітності і годування груддю застосування лікарського засобу можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози

«Камфорний спирт-Вішфа» застосовувати дорослим зовнішньо для розтирань при наведених паталогічних процесах. Розтирати шкіру 2–3 рази на добу.

Тривалість лікування визначається індивідуально.

Діти.

Не застосовувати дітям віком до 12 років.

Передозування

У разі передозування можливе посилення побічних реакцій. Терапія симптоматична.

Побічні ефекти

Можливі прояви алергічних реакцій, висипи, кропив'янка, подразнення шкіри, головний біль, запаморочення.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!

Термін придатності

5 років.

Лікарський засіб не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка

По 40 мл у флаконах.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Виробник

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.

Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка, вул. Корольова, б. 4.