

## **Склад**

*діюча речовина:* етанол;

не менше 95,1 % об/об (92,6 % м/м) і не більше 96,9 % об/об (95,2 % м/м) етанолу, а також вода.

## **Лікарська форма**

Розчин для зовнішнього застосування.

*Основні фізико-хімічні властивості:* прозора, безбарвна, летка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна.

## **Фармакотерапевтична група**

Антисептичні та дезінфекційні засоби.

**Код АТХ** D08A X08.

## **Фармакологічні властивості**

*Фармакодинаміка.*

При зовнішньому застосуванні чинить антисептичну, дезінфекційну, місцевопоздражнявальну дію. Етанол коагулює білки, активний відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій та вірусів. Чинить "дубильну" дію на шкіру та слизові оболонки.

*Фармакокінетика.*

При місцевому застосуванні не всмоктується через шкіру.

## **Показання**

Дезінфекція шкіри рук.

## **Протипоказання**

Підвищена індивідуальна чутливість. Гострі запальні процеси шкіри. Дитячий вік до 14 років.

## **Особливі заходи безпеки**

У разі почервоніння і подразнення шкіри необхідно припинити застосування лікарського засобу і змити рідину водою.

Не допускати потрапляння препарату в очі.

### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії**

При зовнішньому застосуванні етанолу результати взаємодії з іншими лікарськими засобами не відомі.

### **Особливості щодо застосування**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

У період вагітності і годування груддю застосування лікарського засобу можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Не впливає.

### **Спосіб застосування та дози**

Зовнішньо – наносять на шкіру за допомогою ватних тампонів, серветок.

*Діти.*

Не застосовувати дітям віком до 14 років.

### **Передозування**

При зовнішньому застосуванні випадки передозування не відомі.

### **Побічні ефекти**

При місцевому застосуванні – подразнення шкіри або слизових оболонок.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.

### **Термін придатності**

5 років.

## **Умови зберігання**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С, подалі від вогню.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

## **Упаковка**

По 100 мл у флаконах скляних; по 100 мл у флаконах полімерних.

Препарат не можна застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

## **Категорія відпуску**

За рецептом.

## **Виробник**

ТОВ «МЕДЛЕВ».