

Состав

действующее вещество: этанол;

не менее 95,1% об/об (92,6% м/м) и не более 96,9% об/об (95,2% м/м) этанола, а также вода.

Лекарственная форма

Раствор для наружного использования.

Основные физико-химические свойства: прозрачная, бесцветная, летучая, легковоспламеняющаяся жидкость. Гигроскопическая.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептические и дезинфицирующие средства.

Код АТХ D08A X08.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

При наружном применении оказывает антисептическое, дезинфицирующее, местнораздражающее действие. Этанол коагулирует белки, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов. Оказывает "дубильное" действие на кожу и слизистые.

Фармакокинетика.

При местном применении не всасывается через кожу.

Показания

Дезинфекция кожи рук.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность. Острые воспалительные процессы кожи. Детский возраст до 14 лет.

Особые меры безопасности

При покраснении и раздражении кожи необходимо прекратить применение лекарственного средства и смыть жидкость водой.

Не допускать попадания в глаза.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При наружном применении этанола результаты взаимодействия с другими лекарственными средствами не известны.

Особенности по применению

Применение в период беременности или кормления грудью.

В период беременности и кормления грудью применение лекарственного средства возможно только тогда, когда ожидаемая польза матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Не влияет.

Способ применения и дозы

Наружно – наносят на кожу с помощью ватных тампонов, салфеток.

Дети.

Не применять детям до 14 лет.

Передозировка

При наружном применении случаи передозировки неизвестны.

Побочные эффекты

При местном применении – раздражение кожи или слизистых.

В случае возникновения любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.

Срок годности

5 лет

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С, подальше от огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 100 мл во флаконах стеклянных; по 100 мл во флаконах полимерных.

Препарат нельзя применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Категория отпуска

За рецептом.

Производитель

ООО «МЕДЛЕВ».

Адрес

49000, город Днепр, улица Шевченко, дом. 37.