

Состав

действующее вещество: уголь активированный, 1 капсула содержит угля активированного 0,25 г.

вспомогательные вещества: желатин, железа оксид черный (E172), бриллиантовый черный (E 151).

Лекарственная форма

Капсулы.

Основные физико-химические свойства: тело капсулы черного цвета, крышечка черного цвета с нанесенной маркировкой «SORBEX» белым цветом или без нанесения такой маркировки. Содержимое капсулы - сыпучий порошок черного цвета.

Фармакотерапевтическая группа

Энтеросорбенты. Код АТХ А07В А01.

Фармакодинамика

Энтеросорбент СОРБЕКС оказывает детоксикационное действие.

Активное вещество лекарственного средства СОРБЕКС - уголь активированный растительного происхождения с развитой активной поверхностью, способно адсорбировать газы и жидкие токсичные соединения, образующиеся и накапливаются в избыточном количестве при острых и хронических заболеваниях или попадают в организм извне.

Фармакокинетика

Уголь активированный, является нетоксичным инертным веществом. Во время пребывания в организме оно не испытывает химических изменений и метаболических превращений, не всасывается из просвета кишечника, не попадает за пределы желудочно-кишечного тракта, не выявляется в любых концентрациях в биологических жидкостях и удаляется из организма через кишечник.

Показания

СОРБЕКС применяют:

- при хронических отравлениях бытовыми и промышленными токсинами (алкалоидами, солями тяжелых металлов, другими веществами), продуктами питания, лекарственными препаратами, алкогольно-пищевых перегрузках, с целью уменьшения поглощения, предупреждения дальнейшего всасывания и ускорение удаления из организма токсических веществ;
- при проживании в неблагоприятных экологических условиях или воздействия вредных производственных факторов, изменении обычного образа питания во время отпуска, командировки, путешествий;
- в качестве вспомогательной терапии:
 - при расстройствах и инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта (диспепсия, метеоризм, кишечные инфекции, острые и хронические вирусные гепатиты);
 - при заболеваниях, сопровождающихся синдромом эндогенной интоксикации: острых и хронических поражениях печени, почек, аллергических, аутоиммунных и онкологических заболеваниях, а также при повышенном содержании холестерина.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к сорбенту. Язвенные и эрозивные поражения желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, желудочно-кишечное кровотечение, кишечная непроходимость.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Имея адсорбирующие свойства, уголь активированный способен снижать эффективность лекарственных средств, которые принимают одновременно с ним.

Поэтому при сопутствующей фармакотерапии СОРБЕКС принимают за 1 - 1,5 часа до или после приема других лекарственных средств.

При условии соблюдения способа применения, препарат можно применять в комплексной терапии с другими лекарственными средствами.

Особенности применения

Женщинам, которые принимают противозачаточные препараты, рекомендуется в период лечения СОРБЕКС использовать другие противозачаточные средства.

Одновременный прием препарата и пищи уменьшает адсорбционную активность лекарственного средства, поэтому СОРБЕКС принимают за 1 - 1,5 часа до или после приема пищи.

Длительный прием (более 15 суток) может сопровождаться нарушениями всасывания и вызвать в организме дефицит витаминов, гормонов, жиров, белков, требует соответствующей лекарственной или алиментарной коррекции. Кал после приема лекарственного средства СОРБЕКС окрашивается в черный цвет.

При наличии гиповитаминоза, которым может сопровождаться длительное применение угля активированного, необходимо назначать поливитамины.

В состав капсул лекарственного средства СОРБЕКС входит краситель бриллиантовый черный (Е 151), который может вызывать аллергические реакции.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Сорбекс не противопоказан при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Применение в период беременности или кормления грудью

Данных о негативном влиянии лекарственного средства СОРБЕКС в период беременности и кормления грудью нет.

Способ применения и дозы

При метеоризме и диспепсии взрослым применять по 1 - 3 капсулы 3 - 4 раза в сутки.

При отравлениях и интоксикациях взрослым применять по 2 - 6 капсул 3 раза в сутки.

Детям от 7 лет применять по 1 - 3 капсулы 3 - 4 раза в сутки.

Препарат применять за 1,5 - 2 часа до или после еды или приема лекарственных средств, запивая водой.

Курс лечения при острых состояниях составляет до 3 - 5 дней, при хронических

заболеваниях, обусловленных эндогенными интоксикациями, - до 10 - 15 дней.

Дети

Детям до 7 лет нецелесообразно применять препарат в этой лекарственной форме.

Передозировка

Значительное превышение максимальных разовых доз может привести к побочному действию: тошнота, рвота, запоры.

Побочные реакции

Возможны тошнота, рвота и проявления повышенной чувствительности. Длительное применение может сопровождаться расстройствами функций кишечника (диарея, запор), легко устраняются прекращением приема препарата и назначением симптоматической терапии. Длительный прием (более 15 суток) может сопровождаться нарушениями всасывания и вызвать в организме дефицит витаминов, гормонов, жиров, белков, требует соответствующей лекарственной или алиментарной коррекции.

При проявлении каких-либо побочных эффектов, о которых указано в инструкции по применению, срочно сообщите об этом врачу!

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить отдельно от веществ и материалов, которые выделяют газы и пары.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

Капсулы по 0,25 г, по 10 капсул в блистере, по 2 блистера в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «ВАЛАРТИН ФАРМА».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 08135, Киевская обл., Киево-Святошинский р-н, с. Чайки, ул. Грушевского, д. 60.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).