

Состав

действующее вещество: 100 г содержит гидрогеля метилкремниевой кислоты - 69,9 г;

вспомогательные вещества: сахарин натрия дигидрат, натрия цикламат, вода очищенная.

Лекарственная форма

Паста для перорального применения.

Основные физико-химические свойства: однородная пастообразная масса белого цвета, без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Энтеросорбенты. Код АТХ А07В С.

Фармакодинамика

Энтеросгель - инертное кремниеорганическое соединение. При применении проявляет сорбционное действие. Лекарственное средство эффективно адсорбирует среднемолекулярные токсические вещества экзо и эндогенного происхождения, продукты незавершенного метаболизма, инкорпорированы радионуклиды и естественным путем выводит их из организма. Энтеросгель устраняет проявления токсикоза, улучшает функцию кишечника, детоксицирующее функцию печени, почек, нормализует показатели крови и мочи.

Фармакокинетика

Покрывая слизистую оболочку желудка и кишечника, Энтеросгель защищает ее от эрозивных процессов, способствует повышению местного иммунитета. Энтеросгель не всасывается из кишечника и не испытывает метаболических или химических превращений.

Показания

Дезинтоксикация организма при хронической почечной недостаточности, вызванной пиелонефритом, поликистозом почек, нефролитиазом; при токсическом гепатите, вирусном гепатите А и В, холецистите, циррозе печени,

холестазае различной этиологии, гастрите с пониженной кислотностью, энтероколите, колите, диарее; при отравлении алкоголем и наркотическими средствами; при аллергических реакциях, кожных заболеваниях (диатез, нейродермит) при ожоговой болезни; гнойно-септических процессах; токсикозах первой половины беременности; в комплексной терапии дисбиоза кишечника.

Противопоказания

Острая кишечная непроходимость. Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Индивидуальная непереносимость компонентов препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Препарат может снижать действие других лекарственных средств, которые применяются вместе с ним. Не рекомендуется одновременный прием с препаратами, принадлежащих к классу секвестрантов желчных кислот, например с холестирамином, поскольку увеличивается вероятность развития запоров.

Препарат не следует применять вместе с препаратами серебра.

Особенности применения

Принимать препарат следует согласно этой инструкции. При условии соблюдения способа применения (Энтеросгель и другие лекарственные средства принимать с интервалом 1,5-2 часа), препарат можно применять в комплексной терапии с другими лекарственными и профилактическими средствами, в том числе с пребиотиками и пробиотиками (бифидум-, лактобактерии), фитопрепаратами, адаптогенами, иммуномодуляторами.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с механизмами

Не влияет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Препарат можно применять в период беременности и кормления грудью. Следует ограничить применение беременным, имеющих склонность к запорам.

Способ применения и дозы

Принимать внутрь 2-3 раза в день за 1,5-2 часа до или через 2 часа после еды или применения других медикаментов, запивая достаточным количеством воды.

Для взрослых и детей старше 14 лет разовая доза составляет 15 г (столовая ложка), суточная - 45 г.

Для детей от рождения до 3 лет разовая доза составляет 5 г (чайная ложка), суточная - 10 г; в возрасте от 3 до 5 лет - разовая доза - 5 г, суточная - 15 г; от 5 до 14 лет - разовая доза - 10 г (десертная ложка), суточная - 30 г.

Курс лечения - от 7 до 14 суток. При тяжелых формах заболеваний в течение первых трех суток применять двойную разовую дозу, а при хроническом течении болезни (хроническая почечная недостаточность, цирроз печени) возможно более длительное применение препарата.

Дети

Препарат можно применять детям от рождения. Детям до 2 лет перед применением разовую дозу препарата можно смешать с небольшим количеством воды.

Передозировка

Случаев передозировки не описано. При передозировке возможно усиление побочных эффектов.

Побочные реакции

При приеме препарата возможны диспепсические явления. В первые дни приема препарата возможно развитие запора. Для его предотвращения людям, склонным к запорам, в первые два дня приема препарата рекомендуется очистительная клизма на ночь или применение слабительных средств (лактолоза, пикосульфат натрия). Возможны реакции гиперчувствительности. Возможны проявления индивидуальной непереносимости компонентов препарата.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте. Хранить в оригинальной упаковке при температуре не более 25 °С, не допускать замораживания. После вскрытия упаковки хранить в тех же самых условиях в плотно закрытой таре.

Упаковка

По 270 г в контейнерах пластмассовых.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «ЭОФ «КРЕОМА-ФАРМ».

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, г. Киев, ул. Радищева, 3.

Источник инструкции

Инструкция лекарственного средства взята из официального источника — [Государственного реестра лекарственных средств Украины](#).